



Sportsmaster[®] CRF

Balanced

Kiegyensúlyozott tápanyagforrás, kombinált összetétel

18 | 8 | 17 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	2.1%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	3.9%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	12.0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P2O5)	6.0%
K2O	Kálium-oxid	17%
	Vízoldékony (K2O)	17.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
Fe	Vas	0.50%

Leírás

Ahogy a termék neve is sugallja, a Sportsmaster CRF Balanced gyepműtrágyában a nitrogén és a kálium tökéletes egyensúlyban van, ezzel szolgálva az egyenletes és kiegyensúlyozott növekedést. Magnézium- és vastartalma megszünteti a stressz tüneteit és élénkíti a gyep színét. Egyesíti a hagyományosösszetett granulált műtrágya és a 2-3 hónapig tartó, szabályozott feltáródású műtrágya minden előnyét.. A burkolat nélküli szemcsékből fű azonnal felveszi a tápanyagokat, míg a szabadalmaztatott Poly-S és PACE burkolástechnológiátalkalmazó szemcsék tartós tápanyagforrást biztosítanak.. Tökéletes tavasszal és nyáron, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki a gyepből.

Előnyök

- \\ Azonnal felvehető tápanyagokat és burkolt szemcséket is tartalmaz a tartós hatásért.
- \\ Nitrogén és kálium mellett vasat és magnéziumot is tartalmaz
- \\ Sebb szín, egyenletes növekedés és a stressz tüneteinek minimálisra csökkentése

Használati útmutató

- 1 Száraz felületre juttassa ki.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket. A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait.
- 3 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt.. Ne alkalmazza fagyos vagy aszályos időben.
- 4 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik, azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat.
- 5 Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20–30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.