



Sportsmaster[®] CRF

High K

Készítse fel a gyepet a télre a Sportsmaster[®] CRF High K termékkel

16 | 6 | 26
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	16%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.5%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	14.5%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	6%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	4.5%
K ₂ O	Kálium-oxid	26%
	Vízoldékony (K ₂ O)	26.0%

Leírás

A Sportsmaster CRF High K magas káliumtartalma erősíti a sejtfalakat és szabályozza a gyep vízháztartását. Tökéletes a gyep felkészítésére a téli időszakra és az esetlegesen szélsőséges hőmérsékletekre. Tavasszal a gyep gyors és erőteljes növekedéssel hálálja meg az őszi gondoskodást. Ez a 2-3 hónapos hatástartamú intelligens termékből a nitrogén csak akkor táródik fel, amikor az időjárási körülmények megfelelnek a fű növekedésének. Kiválóan alkalmas a téli stresszhatások előtti kondicionálásra. A Sportsmaster[®] CRF High K egyszerre nyújtja a szabályozott feltáródású és a hagyományos összetett műtrágyák előnyeit. A szabadalmaztatott Poly-S és PACE burkolási technológiáinkat alkalmazza, a burkolat nélküli szemcsékből a tápanyagok azonnal felvehetők a gyep számára..

Előnyök

- \\ Azonnal felvehető tápanyagokat és burkolt szemcséket is tartalmaz a tartós hatásért.
- \\ Extra kálium az erősebb sejtfalak és a jobb vízszabályozás érdekében
- \\ Az ideális felkészítés a téli időszakra

Használati útmutató

- 1 Száraz felületre juttassa ki.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket. A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait.
- 3 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. Ne alkalmazza fagyos vagy aszályos időben.
- 4 Ha a járdára, betonra, ruhára stb. szóródik, azonnal mossa le, mert foltot hagyhat.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20–30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.