



Osmocote® Pro

High K 5-6M

A jó bokrosodásért és a kompakt növekedésért

11 | 10 | 19 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	11%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	3.9%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	6.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	1.0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	10%
	Vízoldékony (P2O5)	7.5%
K2O	Kálium-oxid	19%
	Vízoldékony (K2O)	19.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.037%
	Vízoldékony (Cu)	0.023%
Fe	Vas	0.18%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.02%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.008%
	Vízoldékony (Mo)	0.006%
Zn	Cink	0.007%

Leírás

Az Osmocote® Pro High K 5-6M kiválóan alkalmas káliumigényes cserepes dísznövények számára, illetve magas nitrogéntartalmú öntözővíz használata esetén. NPK-ban, magnéziumban és mikroelemekben gazdag összetételével segíti a növények jó bokrosodását és kompakt növekedését. A teljes termesztési ciklusban biztos lehet abban, hogy a 100%-os gyantaburkolat egyenletes tápanyagellátást biztosít növényeinek az előre meghatározott 5-6 hónapos hatástartam alatt.

Előnyök

- \\ Magas mikroelemtartalom
- \\ Vízoldható műtrágyákkal kombinálható
- \\ Magaskáliumtartalom a kompakt növekedésért
- \\ Biztonságos, egyszerű használat, kiváló ár-érték arány

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Pro termék egyedülálló ICL gyantaburkolat-technológiájának köszönhetően megbízható, szabályozott tápanyag-feltárást biztosít növényeinek.
- 2 Az Osmocote® Pro termék vízzoldható műtrágyával kombinálható; dózist a vízzoldható műtrágya mennyiségétől függően csökkentse.
- 3 Az Osmocote® Pro High K 5-6M hatástartama a hőmérséklettől függ. (A termék hatástartama 21 °C-ra lett meghatározva) 16 °C: 6-7 hó 21 °C: 5-6 hó 26 °C: 4-5 hó.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Light feeding	Normal feeding	Heavy feeding
Konténeres faiskolai kultúrák	2-2,5 g/l	3-3,5 g/l	4-4,5 g/l
Cserepes dísznövények	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Virágágyi dísznövények/egynyáriak	2-3 g/l	3-4,5 g/l	4,5-5 g/l

Figyelem! A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például a fóliaalagútban vagy üvegházban történő használathoz, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Ez a termék nem alkalmas ültetőlukba adagolásra és/vagy őszi/téli ültetéshez. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.