



Ficote[®] Total

3-4M

Tápanyagok ott és akkor érhetőek el a növény számára,
 ahol és amikor azokra szükség van

17		9		11		2.0		TE
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		

Leírás

Ezzel a második generációs burkolt műtrágyával több hónapon át biztosíthatja növényei számára az alapvető tápanyagokat. A Ficote[®] Total 3-4M alaptrágyaként használható, kombinálható vízzeloldható műtrágyákkal. A mikroelemek teljes köre mellett 100%-ban burkolt NPK-t tartalmaz az egészséges és mutatós dísnövények érdekében. Ha a hatástartam ideje alatt a feltáródás üteme is fontos, akkor az Osmocote[®] Exact programozott feltáródású műtrágyát ajánljuk. Biztonságos és egységes minőségű termékcsalád.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	17%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.9%



K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.025%
	Vízoldékony (Cu)	0.017%
Fe	Vas	0.22%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.03%
Mo	Molibdén	0.01%
	Vízoldékony (Mo)	0.008%
Zn	Cink	0.008%

Előnyök

- 🔹 Kiváló választás alaptrágyázáshoz
- 🔹 Több hónapos hatástartam, kiváló ár-érték arány
- 🔹 100%-ban burkolt NPK-t, valamint az összes létfontosságú mikorelemet tartalmazza

Alkalmazási javaslatok

Konténeres faiskolai növények

Alacsony dózis: 1,5–2 g/l

Normál dózis: 2–3 g/l

Nagy dózis: 3–4 g/l



Figyelem! A javasolt dózisok alapműtrágyát nem tartalmazó ültetőközegre vonatkoznak. Vegye figyelembe, hogy ezek általános ajánlások. Részletesebb tájékoztatásért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 A Ficote® Total alapműtrágyázásra készült, és vízzeloldható műtrágyákkal kombinálható.
- 2 Nehezebb termesztési körülmények, növényházi termesztés, sóérzékeny és nagyértékű kultúrák nevelése, illetve ültetőlyukba történő adagolás, valamint kizárólag és teljes adagban történő burkolt műtrágya alkalmazása esetén az Osmocote® Exact használatát javasoljuk.
- 3 A Ficote® Total 3-4M hatástartama a hőmérséklettől függ (a termék hatástartamát 21 °C-on határozták meg): 16 °C: 4–5 hónap, 21 °C: 3–4 hónap, 26 °C: 2–3 hónap
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/ficote-total-3-4m-2/>
: 14/05/2024

ICL Growing Solutions

