



5-6

Ficote[®] Total

5-6M

 Több hónapos hatástartam, kiváló ár-érték arány

17 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Leírás

Dísznövények számára kifejlesztett második generációs burkolt alapműtrágya, amely minden olyan alapvető tápanyagot tartalmaz, amelyekre a teljes tenyészidőszak alatt szükségük van. A Ficote[®] Total 5-6M 100%-ban burkolt NPK-t és a mikroelemek teljes körét tartalmazó alapműtrágya, amely vízzeloldható műtrágyákkal kombinálható. Ha a hatástartam ideje alatt a feltáródás üteme is fontos, akkor az Osmocote[®] Exact programozott feltáródású műtrágyát ajánljuk. Biztonság és egységes minőségű termékcsalád.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	17%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízzeloldékony (P ₂ O ₅)	6.6%



K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11%
MgO	Magnézium-oxid	2%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.013%
	Vízoldékony (B)	0.011%
Cu	Réz	0.033%
	Vízoldékony (Cu)	0.02%
Fe	Vas	0.26%
	Vas EDTA (Fe)	0.05%
Mn	Mangán	0.036%
Mo	Molibdén	0.013%
	Vízoldékony (Mo)	0.013%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.009%

Előnyök

- \\ Kiváló választás alaptrágyázáshoz
- \\ 4–7 hónapos hatástartam a hőmérséklettől függően
- \\ 100%-ban burkolt NPK-t, valamint az összes létfontosságú mikroelemet tartalmazza

Alkalmazási javaslatok

Konténeres faiskolai növények

Alacsony dózis: 2–2,5 g/l

Nagy dózis: 4–4,5 g/l

Normál dózis: 3–3,5 g/l



A javasolt dózisok alapműtrágyát nem tartalmazó ültetőközegekre vonatkoznak. Vegye figyelembe, hogy ezek általános ajánlások. Részletesebb tájékoztatásért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 A Ficote® Total alapműtrágyázásra készült, és vízzeloldható műtrágyákkal kombinálható.
- 2 Nehezebb termesztési körülmények, növényházi termesztés, sóérzékeny és nagyértékű kultúrák nevelése, illetve ültetőlyukba történő adagolás, valamint kizárólag és teljes adagban történő burkolt műtrágya alkalmazása esetén az Osmocote® Exact használatát javasoljuk.
- 3 A Ficote® Total 5-6M hatástartama a hőmérséklettől függ (a termék hatástartamát 21 °C-on határozták meg): 16 °C: 6–7 hónap, 21 °C: 5–6 hónap, 26 °C: 4–5 hónap
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 6 További információkért forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/ficote-total-5-6m/>
: 14/05/2024

ICL Growing Solutions

