



Osmocote[®] Pro

Pro 3-4M

Dísznövénytermesztés, ahogy a profik csinálják

17 | 11 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	17%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	9.0%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	1.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	11%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Mn	Mangán	0.04%
Mo	Molibdén	0.015%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.011%

Leírás

Az Osmocote[®] Pro 3-4M segítségével lendületet adhat a késő tavaszi cserepesek fejlődésének.. Magas dózisú NPK-t tartalmazó összetételét a dísnövények intenzív vegetatív növekedési időszakának teljes körű tápanyag-utánpótlására tervezték. A teljes burkolt NPK-t és mikroelemeket tartalmazó, 3-4 hónapos hatástartamú műtrágya tartós tápanyagellátást biztosít növényeinek, Önnek pedig biztonságot a rövid tenészszerű növények esetén is.

Előnyök

- \\ Mikroelemekben gazdag
- \\ Biztonságos, megbízható és egyszerűen használható
- \\ Kiváló ár-érték arány

Használati útmutató

- 1 Egyedülálló ICL gyantaburkolat-technológiájának köszönhetően az Osmocote® Pro pontos, szabályozott tápanyag-utánpótlást biztosít.
- 2 Az Osmocote® Pro vízzoldható műtrágyával kombinálható.
- 3 Vízzoldható műtrágya használata esetén annak mennyiségétől függően csökkentse a dózist.
- 4 Használja az Osmocote® Pro 3-4M terméket a rövid tenyészidejű kultúrákhoz és a késő tavaszi, gyors növekedésű cserepesekhez.
- 5 Az Osmocote® Pro 3-4M hatástartama a hőmérséklettől függ. A termék hatástartama 21 °C-ra lett meghatározva. 16 °C: 4-5 hó 21 °C: 3-4 hó 26 °C: 2-3 hó.
- 6 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 7 Száraz helyen tárolja.
- 8 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.



Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Cserepes növények	1,0-2 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l
Virágágyai dísnövények/ egynyáriak	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l	3,5-4,5 g/l

Figyelem! A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Ne használja felülkezelésre és/vagy őszi/téli cserepezéshez. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.