



Osmocote® Pro

Pro 8-9M

Adja meg növényeinek az összes tápanyagot, amelyekre a teljes tenyészidőszak alatt szükségük van.

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	5.9%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.7%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.017%
	Vízoldékony (B)	0.015%
Cu	Réz	0.041%
	Vízoldékony (Cu)	0.032%
Fe	Vas	0.33%
	Vas EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangán	0.046%
Mo	Molibdén	0.016%
	Vízoldékony (Mo)	0.016%
Zn	Cink	0.020%
	Vízoldékony (Zn)	0.013%

Leírás

Tavaszi cserepezésekhez alkalmas műtrágya, amely 100%-ban burkolt NPK-t, Mg-t és mikroelemeket tartalmaz, így minden szükséges tápanyagot biztosítanak a növényeknek a teljes termesztési időszak alatt. Kiváló ár-érték arány, megbízható és biztonságos. Magas dózisu NPK-t tartalmaz, hogy a növényei a legjobbat kapják. Az Osmocote® Pro egyedülálló gyantaburkolási-technológiája szabályozott tápanyag-feltárást biztosít.

Előnyök

- \\ Magas dózisu NPK és a mikroelemek teljes skálája
- \\ Szabályozott tápanyag-feltárást: folyamatos tápanyagellátás a teljes termesztési időszak alatt
- \\ Kiváló ár-érték arány, biztonságos és könnyen használható

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Pro vízdíható műtrágyával kombinálható. Fontos, hogy a vízdíható műtrágya mennyiségétől függően csökkentse a javasolt dózist.
- 2 Az Osmocote® Pro 8-9M hatástartama a hőmérséklettől függ (a termék hatástartama 21 °C-on kerül meghatározásra): 16 °C: 10-11 hónap, 21 °C: 8-9 hónap, 26 °C: 6-7 hónap.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	3-3.5 g/l	3.5-4.5 g/l	4.5-5.5 g/l
Cserepes növények	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Figyelem! A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. Vegye figyelembe, hogy a javaslatok általános érvényűek: az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.