



Osmocote® Pro

Pro 12-14M

A legjobb választás az őszi és a tavaszi cserepesek tápanyag-utánpótlására

18 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	5.9%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.7%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.4%
P ₂ O ₅	Fosfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.8%
K ₂ O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K ₂ O)	10.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.018%
	Vízoldékony (B)	0.016%
Cu	Réz	0.045%
	Vízoldékony (Cu)	0.035%
Fe	Vas	0.35%
	Vas EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangán	0.049%
Mo	Molibdén	0.017%
	Vízoldékony (Mo)	0.017%
Zn	Cink	0.014%

Leírás

Tökéletes választás a tavaszi és őszi cserepesekhez. Növényei az egyedülálló gyantaburkolat által biztosított szabályozott tápanyagleadásnak köszönhetően az egész tenyészidő alatt hozzájutnak az alapvető tápanyagokhoz. Egészséges növekedésű, dúsán virágzó dísnövények a magas NPK- és magnéziumtartalomnak, valamint az összes alapvető mikroelem megemelt mennyiségének köszönhetően. Az Osmocote® Pro 12-14M biztonságos, megbízható, és remek ár-érték arányt kínál.

Előnyök

- \\ Magas dózisú NPK, Mg és mikroelemek
- \\ A gyantaburkolat a teljes tenyészidőszakon át tartó, szabályozott tápanyag-feltárást biztosít
- \\ Kiváló ár-érték arány, biztonságos és könnyen használható

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Pro vízdíható műtrágyával kombinálva is ideális, azonban fontos, hogy a kijuttatott vízdíható műtrágya mennyiségétől függően csökkentse az alább feltüntetett dózisokat.
- 2 Az Osmocote® Pro 12-14M hatástartama a hőmérséklettől függ (a termék hatástartama 21 °C-on kerül meghatározásra): 16 °C: 15-17 hónap 21 °C: 12-14 hónap 26 °C: 9-11 hónap.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Figyelem! A fenti javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. Vegye figyelembe, hogy ezek a javaslatok általános érvényűek: az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.