



Osmocote®
Exact
Standard

Standard High K 3-4M

 Töltse fel extra káliummal növényeit

11 | 11 | 18 | TE
N P₂O₅ K₂O



Leírás

Az Osmocote® Exact Standard High K 3-4M kiválóan alkalmas olyan cserepes növényekhez, amelyek 3-4 hónapon keresztül magas káliumtartalmú tápanyag-ellátást igényelnek, mint például a ciklámen, az árvácska és a primula. Magas nitrogéntartalmú öntözővíz használata is tökéletes választás, és ideális a lágyszárú évelők számára is. Az Osmocote® Exact Standard High K jól kombinálható a Peters® Professional vízzoldható műtrágyákkal. A javasolt dózisok a vízzoldható műtrágya mennyiségétől függően változnak.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	11%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	4.3%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	6.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	11%
	Vízzoldékony (P ₂ O ₅)	8.2%



K ₂ O	Kálium-oxid	18%
	Vízoldékony (K ₂ O)	18%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.05%
	Vízoldékony (Cu)	0.031%
Fe	Vas	0.25%
	Vas EDTA (Fe)	0.05%
Mn	Mangán	0.03%
	Vízoldékony (Mn)	0.02%
Mo	Molibdén	0.01%
	Vízoldékony (Mo)	0.007%
Zn	Cink	0.01%

Előnyök

- 3-4 hónapon keresztül elérhető tápanyagok
- Biztonságos: szabályozott tápanyag-feltáródásúoldódás, az összes szükséges mikroelemet nagy mennyiségben tartalmazza
- Megbízható: azonos eredmény minden zsákkal
- Egyéni igényekre szabott tápanyag-feltáródás: pontosan megfelel növényei tápanyagigényének

Alkalmazási javaslatok



	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	1,5-2 g/l	2-3 g/l	2-4 g/l
Cserepes növények	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Virágági dísnövények	1,5-2,5 g/l	2-3 g/l	2,5-4 g/l
Évelők	1-1,5 g/l	1,5-2 g/l	1,5-2,5 g/l

****Az Osmocote® Exact Standard ajánlott kijuttatási dózisa g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti dózisok mellett? – A granulátum alkalmazása – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Standard High K Összesen = 15 g/cserép Figyelem! A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. A dózisokat mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Standard High K hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 4-5 hó, 21 °C: 3-4 hó, 26 °C: 2-3 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-high-k-3-4m/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions

 ICL

