



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard 12-14M

Biztonságos és szabályozott tápanyagellátás egész éven át
a hosszú életű növényekért

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.6%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	9%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.050%
	Vízoldékony (Cu)	0.031%
Fe	Vas	0.45%
	Vas EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.020%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Leírás

Az Osmocote[®] Exact Standard 12-14M termékkel megadhatja növényeinek a kiegyensúlyozott, egészséges növekedést és a tartós szépséget, hosszú kultúrák esetén is. Biztonságos használat, állandó és megbízható minőség és szabályozott tápanyag-feltáródás – mindez egyetlen termékben. Ideális a gyors növekedésű konténeres fenyőfelék és örökzöldek számára. A színkóddal jelölt szemcsék segítenek a különböző hatástartamú termékek megkülönböztetésében.

Előnyök

- \\ Egészséges, megfelelően táplált növények egész évben
- \\ Szabályozott tápanyag-feltáródású és az összes szükséges mikroelemet nagy mennyiségben tartalmazza
- \\ Megbízható: azonos eredmény minden zsákkal
- \\ Egyéni igényekre szabott tápanyag-feltáródás: pontosan megfelel növényei optimális növekedéséhez szükséges követelményeknek

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Standard hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, az ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 5-7 hó, 21 °C: 5-6 hó, 26 °C: 4-5 hó..
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

****Az Osmocote® Exact Standard ajánlott kijuttatási dózisa g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti kijuttatási arányok mellett? A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Standard Összesen = 15 g/cserép A konténeres faiskolai állományok őszi cserepesénél összesen 2-3 g/l adagban juttassuk ki, majd tavasszal ismételjük meg a kezelést 2-3 g/l Osmocote® Exact Standard 8-9M termékkel. Figyelem! A javasolt adagok starter műtrágyát nem tartalmazó termeszőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például fóliaalagútban vagy üvegházban történő használat, őszi vagy téli cserepezés, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.