



Osmocote®
Exact
Protect

Protect 8-9M

Programozott tápanyag-feltáródás a kertészeti növények számára 8-9 hónapon keresztül

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K ₂ O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.045%
	Vízoldékony (Cu)	0.028%
Fe	Vas	0.42%
	Vas EDTA (Fe)	0.08%
Mn	Mangán	0.06%
Mo	Molibdén	0.020%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Leírás

Az Osmocote® Exact Protect 8-9M programozott tápanyag-feltáródású burkolt műtrágya őszi/téli ültetések és sóérzékeny növények számára. A teljes adagban kijuttatva tavasszal nincs szükség fejtrágyázásra, ami nagy előnyt jelent az értékesítési csúcsidőszakban. Az Osmocote® Exact Protect 8-9M bekeverhető ültetés előtt a termesztőközegbe, vagy ültetőlyukba is adagolható. Az utóbbi módszert csak jól begyökeresedett, legalább 9-es cserépben nevelt növények esetén javasoljuk. Kizárólag olyan műtrágyaadagoló berendezést használjon, ami a burkolatot nem roncsolja.

Előnyök

- \\ Az Osmocote® Exact Protect 5-6M elnyújtott tápanyag-feltáródási ütemének köszönhetően ideális az őszi/téli ültetésű és sóérzékeny növények számára
- \\ Jobb növekedés a késleltetett tápanyag-feltáródásnak köszönhetően
- \\ Időt és energiát takarít meg az értékesítési csúcsidőszakokban

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Protect hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, az ettől eltérő hőmérsékleten a hatástartam változik, pl. 16 °C: 10-11 hó, 21 °C: 8-9 hó, 26 °C: 6-7 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai állományok	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-5 g/l

****Az Osmocote® Exact Protect granulátum javasolt kijuttatási arányai g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti kijuttatási dózisok mellett? – A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Protect Összesen = 15 g/cserép A dózisok legfeljebb 0,5 kg/m³ starter műtrágyát tartalmazó termeszőközögre vonatkoznak és tájékoztató jellegűek. A legtöbb esetben nem szükséges starter műtrágyát használni. Személyre szabott tanácsért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. Az Osmocote® Exact Protect egy 100%-ban kettős burkolású műtrágya; tápanyag-feltárolása az első 1,5-2 hónapban késleltetett. Nagyon fontos, hogy az Osmocote® Exact Protect terméket a megfelelő ültetési időszakban használja. A körülményektől függően a fő termesztési időszakban szükség lehet kisebb dózisú felülkezelésre, tápoldatozásra. Személyre szabott tanácsért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.