



Osmocote®
Exact
Protect

Protect 5-6M

Tökéletesen időzített tápanyag-feltáródás érzékeny díszfaiskolai növények számára

14 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Garantált elemzés

Oxid		
N	Összes nitrogén	14%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	6.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	7.8%
P2O5		
K2O		
B	Bór	0.02%
	Vízoldékony (B)	0.02%
Cu	Réz	0.045%
	Vízoldékony (Cu)	0.028%
Fe	Vas	0.42%
	Vas EDTA (Fe)	0.08%
Mo	Molibdén	0.020%
	Vízoldékony (Mo)	0.014%
Zn	Cink	0.015%

Leírás

Az Osmocote® Exact Protect 5-6M egy programozott tápanyag-feltáródású műtrágya kettős burkolási (DCT) technológiával kora tavaszi (januári-februári) ültetésű és sóérzékeny faiskolai növények számára. A teljes adag felhasználása esetén nincs szükség fejtrágyázásra, így időt és energiát takarít meg az értékesítési csúcsidőszakokban. A terméket kifejezetten kora tavaszi cserepezésű Calluna, túlevelű örökzöldek, rózsák, gyökér nélküli dugványok, végcserépbe ültetett dugványok és más érzékeny növények számára fejlesztették ki. A második burkolat 4-6 héttel késlelteti a tápanyag-feltáródást, így az összes tápanyagot képes tárolni mindaddig, amíg a növények hatékonyan fel nem tudják venni azokat. Az Osmocote® Exact Protect 5-6M bekeverhető ültetés előtt a termesztőközegbe, vagy ültetőlyukba is adagolható. Az utóbbi módszert csak megfelelő gyökézzel rendelkező dugványokhoz (P9) javasoljuk. Kizárólag a burkolatot nem roncsoló műtrágyaadagolót használjon.

Előnyök

- \\ Az Osmocote® Exact Protect 8-9M termék elnyújtott tápanyag-feltáródási ütemével ideális a kora tavaszi cserepes és érzékeny növények számára
- \\ Jobb növekedés a késleltetett tápanyagfeltáródásnak köszönhetően
- \\ Időt és energiát takarít meg az értékesítési csúcsidőszakokban

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Exact Protect hatástartamát 21 °C-ra határoztuk meg, és az ettől eltérő hőmérséklet ezt a hatástartamot befolyásolja. 16 °C: 6-7 hó, 21 °C: 5-6 hó, 26 °C: 4-5 hó.
- 2 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 3 Száraz helyen tárolja.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási arányok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Közepes tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Konténeres faiskolai kultúrák	1,2-2 g/l	2-3 g/l	3-5 g/l

****Az Osmocote® Exact Protect granulátum javasolt kijuttatási dózisa g/l-ben**** Hogyan kell kiszámítani az egy cserépre vagy konténerre jutó műtrágyaadagot a fenti kijuttatási arányok mellett? – A granulátum használata – 3 literes cseréptérfogat – 5 g/l Osmocote® Exact Protect Összesen = 15 g/cserép A fenti adagolás legfeljebb 0,5 kg/m³ starter műtrágyát tartalmazó ültetőközegekre érvényesek. A javasolt dózisok tájékoztató jellegűek. A legtöbb esetben nem szükséges starter műtrágyát használni. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. Az Osmocote® Exact Protect egy 100%-ban kettős burkolású műtrágya; tápanyag-feltáródása az első 1,5-2 hónapban késleltetett. Nagyon fontos, hogy az Osmocote® Exact Protect terméket a megfelelő ültetési időszakban használja. A körülményektől függően a fő termesztési időszakban szükség lehet kisadagú fejtárgyázás. Személyre szabott tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóhoz. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.