



Sierraform® GT

All Season

Az egészségesebb, erősebb gyepért

18 | 6 | 18 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	1.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	7.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	8.2%
P2O5	Foszfor-pentoxid	6%
	Vízoldékony (P2O5)	5.0%
K2O	Kálium-oxid	18%
	Vízoldékony (K2O)	18.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
Cu	Réz	0.02%
Fe	Vas	0.5%
Mn	Mangán	0.100%
Mo	Molibdén	0.001%
Zn	Cink	0.020%

Leírás

Ha a gyepek külleme elmarad a tökéletestől, és stresszre utaló jeleket mutat, nem kell mást tennie, mint kijuttatni a Sierraform® GT All Season-t. A gyepek néhány napon belül helyre jön. Ez a gyepműtrágya hagyományos feltáródású formában tartalmaz NPK-t, valamint lassan feltáródó nitrogént és káliumot is, a gyepek egészségét javító mikroelemek teljes körét, továbbá magnéziumot a szín élénkítése érdekében. Használhatja gyepszellőztetés után a növekedés serkentésére és regenerálódásra. Az egységes szemcseméretű mikrogranulátumok a szabadalmaztatott MU2 és SiLK burkolási technológiát alkalmazzák. A Sierraform® GT All Season hűvösebb időjárás esetén 6–8 héten át szolgáltatja a tápanyagokat. Ideális választás tavasztól őszig, különösen prémium gyepek esetében.

Előnyök

- Segíti a stressz utáni regenerálódást, helyreállítja a gyepek egészségét
- Kiegyensúlyozott NPK-t, magnéziumot és létfontosságú mikroelemeket tartalmaz
- Még szebb szín és intenzívebb növekedés

Használati útmutató

- 1 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet. Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 2 A kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést. Jelentősen kevesebb nitrogén szabadul fel, ha a talaj hőmérséklete 10 °C alatt van.
- 3 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz: ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával vagy úszómedencével érintkezik.
- 4 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 20–30 g/m²

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést, Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.