



ProTurf®

18-0-7+3CaO+3MgO

Lassítson le!

18 | 0 | 7 | 8 | 3
N P2O5 K2O CaO MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.5%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	14.6%
	Ureaformaldehide (N-MU)	1.9%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	7%
	Vízoldékony (K ₂ O)	7%
CaO	Kalcium-oxid	8%
	Vízoldékony (CaO)	8%
MgO	Magnézium-oxid	3%
	Vízoldékony (MgO)	2.5%

Leírás

A lassú és egyenletes növekedésű, kiváló minőségű gyepet szeretne?. Használja már a szezon elején a ProTurf® 18-0-7+3CaO+3MgO terméket. A szabályozott feltáródású műtrágya-technológia révén segít elkerülni a gyep nem kívánatos növekedési kilengéseit. A burkolat nélküli szemcséknek köszönhetően még hűvösebb időjárási körülmények között is garantálja a gyors gyepreakciót. Magas magnéziumtartalma révén élénkíti a gyep zöld színét, és javítja egészségi állapotát.

Előnyök

- \\ A gyep gyorsan reagál rá, még hideg időjárási viszonyok között is
- \\ Kiváló minőségű szabályozott feltáródású műtrágya kora tavaszi használatra

Használati útmutató

- 1 Közvetlenül a száraz gyepfelszínre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 3 A kijuttatás gipszellőztetés után javasolt. A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gipszellőztetést.
- 4 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik, azonnal mossa le, mivel a termék elszíneződést okozhat.
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat mindig alaposan zárja le.
- 6 Száraz helyen tárolja.
- 7 További információkért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:	20,00–35,00 g/m ²
Javasolt átlagos dózis:	27,5 g/m ²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.