



## Sierrablen® Plus

### Active 3M

Aktív növekedés az aktív igénybevételhez

19 | 5 | 18 | 2.0 | TE  
N P2O5 K2O MgO



## Garantált összetétel

| Oxid |                                        |        |
|------|----------------------------------------|--------|
| N    | Összes nitrogén                        | 19%    |
|      | Ammóniás nitrogén (N-NH <sub>4</sub> ) | 1.2%   |
|      | Karbamid-nitrogén (N-Urea)             | 15.6%  |
| P2O5 | Fosfor-pentoxid                        | 5%     |
|      | Vízoldékony (P2O5)                     | 3.7%   |
| K2O  | Kálium-oxid                            | 18%    |
|      | Vízoldékony (K2O)                      | 18.0%  |
| MgO  | Magnézium-oxid                         | 2.0%   |
| Cu   | Réz                                    | 0.010% |
| Mn   | Mangán                                 | 0.10%  |
| Zn   | Cink                                   | 0.030% |

## Leírás

Ha aktív növekedést szeretne az aktív igénybevételhez, ne keressen tovább! Itt a Sierrablen® Plus Active 3M. Ez a magas nitrogén- és káliumtartalmú, szabályozott feltáródású műtrágya ideális tavaszi és őszi kijuttatásra. Az ICL szabadalmaztatott Poly-S burkoolási technológiájának köszönhetően a gyeptől a 3 hónapos szabályozott tápanyag-feltáródás előnyeit élvezheti. Teljes körű mikroelem-csomagjának köszönhetően segíti a stressz utáni regenerálódást és javítja a gyeptől általános egészségi állapotát, fokozza a színét és elfedi a stressz tüneteit a hozzáadott magnéziumnak köszönhetően.

## Előnyök

- \\ Kiegyensúlyozott nitrogén- és káliumtartalom, hozzáadott foszforral
- \\ Javítja a gyeptől színét és általános egészségi állapotát
- \\ Elfedi a stressz jeleit, és segíti a regenerálódást

## Használati útmutató

- 1 Közvetlenül a száraz felületre juttassa ki.
- 2 A kijuttatás utáni beöntözés segíti műtrágyaszemcsék talajra jutását, és fokozza az azonnali hatást. Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 3 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

## Javasolt használati idő

| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 25,00–35,00 g/m<sup>2</sup>

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

## Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.