



Micromax®

TE Mix

Micromax® termékünkkel biztos lehet benne, hogy növényei semmiben sem szenvednek hiányt

0 | 0 | 0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	0%
B	Bór	0.70%
	Vízoldékony (B)	0.70%
Cu	Réz	0.500%
	Vízoldékony (Cu)	0.500%
	Réz EDTA (Cu)	0.500%
Fe	Vas	7.80%
	Vízoldékony (Fe)	7.80%
	Vas EDTA (Fe)	5.40%
	Vas-DTPA (Fe)	2.40%
Mn	Mangán	2.60%
	Vízoldékony (Mn)	2.60%
	Mangán EDTA (Mn)	2.60%
Mo	Molibdén	0.320%
	Vízoldékony (Mo)	0.320%
Zn	Cink	1.300%
	Vízoldékony (Zn)	1.300%
	Cink EDTA (Zn)	1.300%

Jellemzők

Leírás

Ez az összetett mikroelem-műtrágya egy igazi klasszis: tartalmazza az összes főbb mikroelemet. A körülmények vagy a rossz időjárás gyakran tápanyagvesztéssel járnak, de nem ezzel a termékkel – az összes kationos elemet kelatizált formában tartalmazza, így azok akár ötször könnyebben felvehetők növényei számára. Az alapvető mikroelemek gondosan összeállított egyensúlya megvédi növényeit a hiányállapottól, valamint serkenti a gyökérfejlődést és az egészséges növekedést. A Micromax® WS TE az X3 biostimulátort is tartalmazza, amely javítja a tápanyagok felszívódását és felvételét. Ráadásul 100%-ban vízoldható a gyors és egyszerű bekeverés érdekében.

Előnyök

- Alapvető mikroelemek kiegyensúlyozott összetétele
- Erősebb gyökerek az egészséges növekedés érdekében
- Gyors tápanyagfelvételt tesz lehetővé

Használati útmutató

- 1 A MicroMax® WS TE egy prémium termék, amely könnyen és biztonságosan használható a mezőgazdaságban és a kertészetben.
- 2 Bár elsődleges kijuttatási módja a tápoldatozás, lombtrágyázásra is alkalmazható.
- 3 Tárolja a terméket hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
- 4 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis

Dísznövények és zöldségfélék	Megelőzésként: 1-2 kg/ha palántázást követően, a gyökeresedés utáni szakaszban, 4-6 leveles állapotban. Gyógyító jelleggel: alkalmazzon 1-2 kg/ha dózist a mikroelemhiány első tüneteinek megjelenésekor, majd végezzen további két kezelést 2-3 hetes időközönként
Fán termő és bogyós gyümölcsök	Megelőzésként: 3-6 kg/ha kora tavasszal, amint a fák már elegendő lombozattal rendelkeznek, hogy felszívják a permetet. Gyógyító jelleggel: terméskötéskor kezdje 3-6 kg/ha adagú kijuttatással. Figyelje a nyomelemhiányra utaló tüneteket, és szükség esetén azonnal végezzen további 2-3 kezelést 2-3 hetes időközönként.

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.