



ProSelect®
Straights

Riptide

/// Csúcsminőségű látványi hatás és kimagasló ellenállóképesség a betegségekkel szemben

Leírás

A ProSelect® Riptide az Egyesült Királyságban és a skandináv országokban a legnépszerűbb fajták közé tartozik. Az európai éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodott, vékony levelű tarackos tippán. Ez a sűrűn elágazó fajta kiváló teljesítményt nyújt a hideg időszakokban. Tartós szintartás, fagy- és betegségtűrés jellemzi. A melegebb régiókban a nyári stresszhatásokkal szemben is megállja a helyét.

A golfpályák green, tee és fairway részeihez ideális Riptide gyorsan megered, különösen tavasszal, majd ősszel és télen is megőrzi ragyogó középzöld színét. A Riptide felfelé törő, többen sűrűn elágazó hajtásrendszerű fajta.. Kiválóan ellenáll a gyepek barna foltosságának (*Rhizoctonia solani*), a levélfoltosságnak/szártőrothadásnak (antraknózis), a rózsaszín fonálasodásnak (*Fusarium*) és a torgombás foltosságnak (*Gaeumannomyces graminis*).

A National Turfgrass Evaluation Program (NTEP) Egyesült Államokra és Kanadára kiterjedő független fűfajta-vizsgálatai során a Riptide a legjobb helyezést érte el mind a küllem, mind a betegségekkel szembeni ellenállóképesség terén.

Előnyök

- /// Kiváló sarjnövekedési erély
- /// Smartstart bevonattal rendelkező vetőmag a gyors csírázás érdekében
- /// Kiemelkedő ellenállóképesség a betegségekkel szemben

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

Új gyepterület kialakításához vessen 5–8 g/m² mennyiséget őszi vagy tavasszal.

Felületkezeléshez vessen 3–5 g/m² mennyiséget, hogy egységes zöldfelületet érjen el.

A csírázás és a megerősödés ideje alatt tartsa nedvesen a talajt.

Minimum 12 °C-os talajhőmérsékleten 4–7 nap alatt várható a csírázás.

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Az ICL olyan általános műtrágyázási programot javasol, amelyben a nitrogén éves mennyisége 10–20 g/m², a foszforé 5–7 g/m², a káliumé pedig 25–40 g/m².
- 2 Ellenőrizze a mikrotápanyagok mennyiségét levélvizsgálatokkal az év folyamán, majd egy kora tavaszi talajvizsgálattal.
- 3 A Riptide tápanyag- és vízigénye kisebb, ami csökkenti a fenntartási költségeket.
- 4 Eső hiányában mélyen és ritkán öntözzön; a felületett gyepterület esetében mérsékeltebben és gyakrabban öntözzön.
- 5 A gyepterület használatától függően 2,5–10 mm-nél nyírjon.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D



Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/turf-landscape/products/proselect-riptide/>
 : 12/05/2024