



**Osmocote®
5**

| 8-9M

Gyors kezdeti fejlődés kora tavasszal

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	7.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	8.8%
P2O5	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P2O5)	6.0%
K2O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K2O)	12.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.2%
	Vízoldékony (MgO)	0.6%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.30%
	Vízoldékony (Fe)	0.30%
	Vas EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangán	0.05%
	Vízoldékony (Mn)	0.05%
	Mangán EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.012%
	Vízoldékony (Zn)	0.012%
	Cink EDTA (Zn)	0.012%

Leírás

Az Osmocote® 5 szabályozott tápanyag-feltárási technológiája minden igényt kielégít a kora tavaszi cserepezés során. Az 5. generációs, programozott tápanyag-leidású technológia a növények számára tartós, biztonságos és hatékony tápanyagellátást biztosít 8-9 hónapos hatástartammal. Az OTEA-rendszer optimalizálja a mikroelemek hasznosulását és felvételét, és garantáltan a lehető legszebb szint, legjobb növekedést és általános egészséget biztosítja a növények számára.

Előnyök

- \\ NutriMatch-Release technológia a jobb, pontosabb tápanyagfelvétel érdekében
- \\ Megbízható minőség: minden egyes zsák Osmocote 5 ugyanazt az eredményt hozza.
- \\ Az eddigi legjobb feltárási hatékonyság.

Használati útmutató

- 1 Használja az Osmocote® 5 8-9M terméket elsősorban konténeres faiskolai kultúrákhoz, évelőkhöz és különböző rövid idejű cserepes növénykultúrákhoz.
- 2 Az optimális szemcseeloszlás érdekében cserepezés előtt keverje a terméket közvetlenül a termesztőközegbe.
- 3 Az Osmocote® 5 használható közege szórva. További javaslatokért forduljon az ICLszaktanácsadóhoz.
- 4 Ha 200 gramm/ m3 termesztőközegnél magasabb dózisban használ Micromax Premiumot és az Osmocote 5-öt is a közegbe keverve szeretné alkalmazni, előbb konzultáljon az ICL szaktanácsadóival a pontos alkalmazás és dózis megállapítása érdekében.
- 5 Az Osmocote® 5 Peters és Universol® vízzoldható műtrágyákkal kombinálható. Konkrét javaslatokért forduljon az ICLszaktanácsadóhoz.
- 6 Az Osmocote® 5 8-9M hatástartamát a hőmérséklet befolyásolhatja. (A termék hatástartama 21 °C-ra lett meghatározva) 16 °C: 10-11 hó 21 °C: 8-9 hó 26 °C: 6-7 hó.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 8 Száraz helyen tárolja.

Alkalmazási javaslatok

	Átlagos tápanyagigény	Nagy tápanyagigény	Minimális javasolt dózis (ha más vízoldható műtrágyákkal kombinálva használja)
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (hajtatott kultúrák)	3.5-4.5 g/l	4-4.5 g/l	2-3 g/l
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (szabadföldi kultúrák)	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l
Cserepes növények	4.5-5.5 g/l	5.5-6.5 g/l	3-4 g/l

Fontos! A starter műtrágyák maximum dózisa termesztőközegbe keverve 0,5 kg/m³. Az Osmocote pontos adagolása a cserép méretétől is függ. Nagyobb cserépbe történő átültetés esetén az új cserépben lévő termesztőközegben növelni kell a dózist. Pontos termesztési körülményekre és növényfajtákra szabott ajánlásért lépjen kapcsolatba az ICL szaktanácsadójával. A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például a fóliaalagútban vagy üvegházban történő használathoz, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Ez a termék nem alkalmas ültetőlyukba adagoláshoz és/vagy őszi/téli ültetéshez. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szaktanácsadójához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.