



Osmocote® 5

5 5-6M

Ötcsillagos növekedés öt hónapon át

16 | 8 | 12 | 2.2 | TE
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	7.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	8.8%
P2O5	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P2O5)	6.0%
K2O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K2O)	12.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.2%
	Vízoldékony (MgO)	0.6%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.30%
	Vízoldékony (Fe)	0.30%
	Vas EDTA (Fe)	0.30%
Mn	Mangán	0.05%
	Vízoldékony (Mn)	0.05%
	Mangán EDTA (Mn)	0.05%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.012%
	Vízoldékony (Zn)	0.012%
	Cink EDTA (Zn)	0.012%

Leírás

Az Osmocote® 5 szabályozott tápanyag-leadási technológia segítségével teljes mértékben kézben tarthatja a késő tavaszi ültetésű dísznövények fejlődését. Ez az 5. generációs, programozott tápanyag-feltárástechnológia 5-6 hónapos hatástartama alatt tartós, biztonságos és hatékony tápanyagellátást biztosít növényeinek. A lehető legjobb növényeszt, egészséget és növekedést érheti el, ha az OTEA technológiával optimalizálja a mikroelemek hasznosulását és felvételét.

Előnyök

- \\ A NutriMatch-Release technológiával jobb, pontosabb a tápanyagfelvétel
- \\ Az eddigi legjobb feltárási hatékonyság
- \\ Megbízható minőség: minden egyes zsák Osmocote ugyanazt az eredményt hozza.

Használati útmutató

- 1 Használja az Osmocote® 5 5-6M terméket rövid tenyészidejű konténeres faiskolai kultúrákhoz, évelőkhöz és különböző cserepes növénykultúrákhoz.
- 2 Az optimális szemcseeloszlás érdekében cserepezés előtt keverje a terméket a termesztőközegbe.
- 3 Az Osmocote® 5 használható cserépbe szórásos módszerrel.
- 4 Ha 200 gramm/ m3 termesztőközegnél magasabb dózisban használ Micromax Premiumot és az Osmocote 5-öt is a közegbe keverve szeretné alkalmazni, előbb konzultáljon az ICL szaktanácsadóival a pontos alkalmazás és dózis megállapítása érdekében.
- 5 Az Osmocote® 5 Peters és Universol® vízőldható műtrágyákkal kombinálható.
- 6 Az Osmocote® 5 5-6M hatástartamát a hőmérséklet befolyásolhatja. (A termék hatástartama 21 °C-ra lett meghatározva) 16 °C: 5-7 hó 21 °C: 5-6 hó 26 °C: 4-5 hó.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 8 Száraz helyen tárolja.

Alkalmazási javaslatok

	Átlagos tápanyagigény	Nagy tápanyagigény	Minimális javasolt dózis (ha más vízoldható műtrágyákkal kombinálva használja)
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (hajtatott kultúrák)	2-2.5 g/l	3-4 g/l	2 g/l
Konténeres faiskolai állományok és évelő növények (szabadföldi kultúrák)	3-3.5 g/l	4-5 g/l	2-3 g/l
Cserepes növények	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l
Virágágyi dísznövények/balkonnövények	3-4 g/l	4-5.5 g/l	2-3 g/l

Fontos! A starter műtrágyák maximum dózisa termesztőközegbe keverve 0,5 kg/m³. Az Osmocote pontos adagolása a cserép méretétől is függ. Nagyobb cserépbe történő átültetés esetén az új cserépben lévő termesztőközegben növelni kell a dózist. Pontos termesztési körülményekre és növényfajtákra szabott ajánlásért lépjen kapcsolatba az ICL szaktanácsadójával. A javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A javaslatok általános érvényűek. Az adagolást mindig az adott helyzethez, például a fóliaalagútban vagy üvegházban történő használathoz, illetve a konkrét éghajlati viszonyokhoz kell igazítani. Ez a termék nem alkalmas ültetőlyukba adagoláshoz és/vagy őszi/téli ültetéshez. Részletesebb tanácsért forduljon az ICL szak-tanácsadójához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.