



Peters® Professional

Blossom Booster

Jobb bimbóképződés, dúsabb virágzás

10 | 30.0 | 20.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	10%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	5.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	30.0%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	30.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	20.0%
	Vízoldékony (K ₂ O)	20.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Jellemzők

Leírás

Ezzel a magas hatóanyagtartalmú készítménytkifejezetten arra fejlesztették ki, hogy serkentse a bimbóképződést és a dúsabb virágzást. Tőzegalapú közegben termesztettvirágágyai dísznövényekhez, virágzó cserepes növényekhez és konténeres faiskolai kultúrákhoz, virágos cserjékhez alkalmazható a bimbóképződés időszakban.. A Peters® Professional Blossom Booster egy kiváló minőségű vízzoldható műtrágya, amely nem tartalmaz vivőanyagokat, csak olyan tiszta hatóanyagokat amelyekre a növényeinek szüksége van: NPK-t, magnéziumot és mikroelemeket. Az M-77 kelátképző formula csak a Peters® termékekben található meg. A magas foszfáttartalom és az 1:2 N:K arány biztosítja, hogy növényei bőségesen virágozzanak!

Előnyök

- \\ Kifejezetten a bimbóképződés és a virágfejlődés elősegítésére fejlesztették ki
- \\ Apró, kiváló vízzoldható szemcsék
- \\ A kijuttatást követően a növények gyorsan reagálnak a kezelésre

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a Peters® Excel Blossom Booster teljesen feloldódjon.
- 2 Ne keverje a Peters® Excel termékkel.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.