



Peters® Professional

Pot Plant Special

Kompakt növekedés, ragyogó virágszín, piacos
dísznövények

16 | 11 | 32 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	16%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	9.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	2.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	11%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	11.0%
K ₂ O	Kálium-oxid	32%
	Vízoldékony (K ₂ O)	32.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Jellemzők

Leírás

Ha szemet gyönyörködtető cserepes növényeket szeretne, használja a Peters® Professional Pot Plant Special terméket! Az 1:2 N:K-arány ragyogó színt ad, és biztosítja a kompakt növekedést. A 15-11-29 NPK összetétel nagy mennyiségben tartalmaz könnyen felvehető nitrát-nitrogént. Minden megtalálható benne, ami tápanyaggal tölti fel a cserepes növényeket, beleértve az NPK-t, a magnéziumot, a mikroelemeket, valamint a jól ismert Peters® M-77 kelátképző formulát. Gyors növényi reakció: a legjobb választás tőzegalapú közegekhez: a cserepes növények, a virágágyai dísznövények és a konténeres faiskolai kultúrákhoz.

Előnyök

- \\ Kifejezetten a cserepes dísznövényekhez és más tőzegalapú közegben nevelt konténeres kultúrákhoz kifejlesztve
- \\ Apró, könnyen vízzoldható szemcsék
- \\ Élénk szín, kompakt növekedés

Használati útmutató

- 1 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a Peters® Professional Pot Plant Special teljesen feloldódjon.
- 2 Ne keverje a Peters Excel termékkel.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 4 Száraz helyen tárolja.
- 5 Egyedi körülményre szabott, részletes javaslatokért és további információért forduljon az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0,5-1,5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.