



Peters Excel

CalMag Grower

Egyetlen tankkeverékkel a legjobbat hozhatja ki dísznövényeiből

15 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	15%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	11.5%
	Ammóniás nitrogén (N-NH4)	1.4%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	2.1%
P2O5	Foszfor-pentoxid	5.0%
	Vízoldékony (P2O5)	5.0%
K2O	Kálium-oxid	15.0%
	Vízoldékony (K2O)	15.0%
CaO	Kalcium-oxid	7.0%
	Vízoldékony (CaO)	7.0%
MgO	Magnézium-oxid	3.0%
	Vízoldékony (MgO)	3.0%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.015%
	Vízoldékony (Cu)	0.015%
	Réz EDTA (Cu)	0.015%
Fe	Vas	0.120%
	Vízoldékony (Fe)	0.120%
	Vas-DTPA (Fe)	0.120%
Mn	Mangán	0.060%
	Vízoldékony (Mn)	0.060%
	Mangán EDTA (Mn)	0.060%
Mo	Molibdén	0.010%
	Vízoldékony (Mo)	0.010%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Leírás

A CalMag Grower ágy öntözővizek esetén a kalciumhiány megelőzésére szolgáló vízzoldható műtrágya. 1:1-es N:K-arányával serkenti a növekedést. Folyamatos kalcium- és magnéziumellátást biztosít a növényeknek, így azok lenyűgöző színekavalkáddal gyönyörködtetnek. Kiváló minőségű hatóanyagokat és kelatizált mikroelemeket tartalmaz, amelyek mindig garantálják a kiváló eredményt. Az M-77 kelátképző formula a mikroelemek maximális hasznosulását és felszívódását biztosítja.

Előnyök

- \\ Minden tápanyag egy törzsoldattartályban, a kalciummal együtt
- \\ Növekedésfokozó 1:1-es N:K-arány, megbízható minőség
- \\ Kifejezetten lágy vízhez kifejlesztve

Jellemzők

Használati útmutató

- 1 A termék kalcium-nitráttal (50:50) egy tartályban keverhető. Egytartályos formula, amellyel a növény számára az összes szükséges tápelem pótolható.
- 2 A törzsoldatot legjobb 1-2 órával a felhasználás előtt elkészíteni: alaposan keverje össze, lehetőleg meleg vízzel, hogy a CalMag Grower teljesen feloldódjon.
- 3 Egyedi körülményekre szabott, részletes javaslatokért forduljon ICL Specialty Fertilizers tanácsadójához. A foszforsav kivételével ne keverje a Peters® Excel terméket más NPK-, vagy foszfortartalmú műtrágyával.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan ragassza le.
- 5 Száraz helyen tárolja.

Alkalmazási javaslatok

Folyamatos tápoldatozás

0.5 – 1.5 g/liter

Alkalmi tápoldatozás

(pl. hetente egyszer) 0,8-2 g/liter

Figyelem! A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.