



Fordulat a gyep állapotában – pillanatok alatt



Leírás

Jellemzők

Prémium vízoldható gyepműtrágya. A szabadalmaztatott TMax technológiánk és egy extra adag, több forrásból származó nitrogénnek köszönhetően a tápanyagok a leveleken és a gyökereken át egyaránt gyorsan felszívódnak és jól hasznosulnak. Káliumot is tartalmaz a folyamatos, egyenletes növekedésű, ellenálló gyep érdekében, valamint kelát formájában vasat az élelkebb zöld színért. Vízoldható, ezért ideális kiegészítő nitrogén- és vaspótlásra a granulált alapműtrágya mellé, hogy a gyep a teljes vegetációs időszakban kiváló minőségű legyen.

Előnyök

- Magas nitrogéntartaloma gyep gyors zöldülése érdekében
- Erősebb, ragyogóbb színű, egyöntetű gyep
- Jól kombinálható agranulátum formulájú alapműtrágyákkal

Használati útmutató

- 1 A Sportsmaster® WSF termékek egy tartályban keverhetők a termékcsalád más termékeivel és a H2Pro®, H2Pro® Maximize nedvesítőszerrel. Fagyos vagy aszályos időben ne használja.
- 2 Annak érdekében, hogy a műtrágya teljesen feloldódjon, a szükséges mennyiséget egy félig teli permetezőtartályba adagolja, majd keverje 10-15 percig.
- 3 Ezután tölts fel teljesen a tartályt vízzel. A víz hőmérséklete hatással van az oldódás sebességére. A Sportsmaster® WSF kijuttatásához használt víz mennyisége befolyásolja a növények tápanyagfelvételét.
- 4 Lombtrágyázáshoz alacsony vízmennyiséget használjon (300–600 l/ha), és a felszívódás optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékletet és a napsütéses időjárást.
- 5 Ha gyökéren keresztüli felszívódáshoz juttatja ki, használjon nagy vízmennyiséget (600–1000 l/ha), és közvetlenül utána legalább 2-3 percig öntözzön, hogy biztosítsa a szükséges mennyiséget, és csökkentse a gyepekárosodásának kockázatát.
- 6 Ha járdára, betonra, ruhára stb. szóródik: azonnal söpörje le, mert foltot hagyhat. Vasat tartalmaz, ezért ne alkalmazza, ha fennáll annak a veszélye, hogy betonnal, márvánnyal, kővel, szövetekkel vagy úszómedencével érintkezik.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis: 15–60 kg/ha

A dózis vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.