



Agroleaf[®] Liquid

High K

Hármas hatású folyékony kálium a folyamatos tápanyagellátáshoz

8 | 8 | 16 | TE
N P₂O₅ K₂O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	8%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	8%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	8%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	8%
K ₂ O	Kálium-oxid	16%
	Vízoldékony (K ₂ O)	16%
B	Bór	0.020%
	Vízoldékony (B)	0.020%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.060%
	Vízoldékony (Fe)	0.060%
Mn	Mangán	0.030%
	Vízoldékony (Mn)	0.030%
	Mangán EDTA (Mn)	0.030%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.015%
	Vízoldékony (Zn)	0.015%
	Cink EDTA (Zn)	0.015%

Leírás

Az Agroleaf[®] Liquid High K egy kiváló minőségű folyékony lombtrágya, amely megelőzi és megszünteti a káliumhiányt. Kelatizált mikroelemek teljes skáláját tartalmazza. Az Agroleaf[®] Liquid High K tartalmazza az ICL által kifejlesztett egyedülálló F3 SurfActive technológiát, amely háromféle módon növeli az egyes lombtrágyázások hatékonyságát: a jobb teríthetőség, tapadás és megtartás révén. Az F3 csökkenti a permetecseppek felületi feszültségét, így a tápoldat jobban szétterül a leveleken, ez nagyobb tápanyag-lefedettséget és jobb felvételt eredményez; a lombfelületen több tápanyag képes megtapadni, nem lefolyik le azonnal a viaszos levelekről. Ezen felül az F3 technológia lehetővé teszi, hogy a levél felületén kis tápanyagraktárak képződjenek, amelyek újranedvesedés után újra aktiválódnak; ez megakadályozza az elpárolgást, ezáltal meghosszabbítja a tápanyagellátást a hatékonyabb lombtrágyázás érdekében.

Előnyök

- \\ Megszünteti és megelőzi a káliumhiányt a stressz csökkentése érdekében
- \\ Kelatizált mikroelemekkel kiegészített
- \\ Jobb permetterítődés, tapadás és megtartás

Használati útmutató

1 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Az alábbi növénykultúrákban javasolt	Adagolás liter/ha	Permetlésszükséglet liter/ha	Koncentráció (%)	Ajánlott kijuttatási időszak
Zöldségfélék, általánosan	5-10	300-600	1.7	Terméskötéstől betakarításig 4-5 alkalommal
Saláták, káposztafélék	3-5	300-600	1	Fejesedés után 2-3 alkalommal
Vöröshagyma, fokhagyma	3-6	300-600	1	Hagymanövekedéskor 1-2 alkalommal
Bogyós gyümölcsök, gyümölcsösök, szőlőültetvények	5-10	600-1000	0.8-1	Terméskötéstől a betakarítás előtt 2 héttel 4-5 alkalommal
Burgonya	3-6	250-300	1.2-2	Gumónövekedéskor 2-3 alkalommal
Napraforgó	3-6	200-300	1.5-2	A virágzás kezdetekor
Olajrepcse	3-6	200-300	1.5-2	A virágzás kezdetekor
Dísznövények	2-3	600-1000	0.3	Virágzás előtt és után 1-2 alkalommal

Használjon kisebb dózist kisebb hektáronkénti vízmennyiség esetén, és nagyobb dózist, ha növeli a permetlé mennyiségét. A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.