



Greenmaster® Liquid

NK

Erős, egyenletes növekedésű gyepfelület

10 : 0 : 10 : TE
N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	10%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	8.7%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	10%
	Vízoldékony (K2O)	10.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.004%
	Vízoldékony (Cu)	0.004%
	Réz EDTA (Cu)	0.004%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.001%
	Vízoldékony (Mo)	0.001%
Zn	Cink	0.004%
	Vízoldékony (Zn)	0.004%
	Cink EDTA (Zn)	0.004%

Leírás

A Greenmaster® Liquid High NK kiegyensúlyozott NK-tartalmú műtrágya, amely ideális a tavasztól ősziig történő használathoz. Foszformentes összetétel, 1:1-es N:K-aránya kiegyensúlyozott növekedést és erős, ellenálló gyepfelületet eredményez. A Liquid High NK termék Tmax technológiát alkalmazza, amely serkenti a tápanyagok felvételét a talajból a szebb szín és az egészséges fejlődés érdekében. Ateljes mikroelemcsomag segít abban, hogy a gyep gyorsan regenerálódjon a stresszes időszakokat követően, akár 6 héten át tartó hatástartammal.

Előnyök

- \\ Kiegyensúlyozott NK-tartalmú műtrágya foszfor nélkül
- \\ Egyenletes növekedést és ellenállóbb gyepfelületet képez
- \\ Javítja a gyep színét és egészségét

Használati útmutató

- 1 Áprilistól szeptemberig alkalmazható. A lombon keresztül történő tápanyagfelvétel optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékleten és napsütéses időben történő kijuttatást. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 2 A Greenmaster® Liquid termékek a termékcsaládon belüli más termékekkel (a Ca-Booster kivételével) egy permetlé tartályban keverhetők. Egy tartályban keverhető a H2Pro és H2Pro Maximize talajnedvesítő szerekkel is.
- 3 A permetlé elsodródásának minimalizálása és a permetlé minőségének javítása érdekében használja a TurfMark® Extra szórás képjelző adalékot. A Greenmaster® Liquid termékek kijuttatásához használt vízmennyiség befolyásolja a növények tápanyagfelvételének módját.
- 4 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

40-120 l/ha

Javasolt átlagos dózis:

80 l/ha

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.