



Greenmaster® Liquid

STEP (Chelated trace elements)

A STEP-pel egy lépéssel előre jut



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	0%
B	Bór	0.20%
	Vízoldékony (B)	0.20%
Cu	Réz	1.000%
	Vízoldékony (Cu)	1.000%
	Réz EDTA (Cu)	1.000%
Mn	Mangán	1.50%
	Vízoldékony (Mn)	1.50%
	Mangán EDTA (Mn)	1.50%
Mo	Molibdén	0.100%
	Vízoldékony (Mo)	0.100%
Zn	Cink	1.000%
	Vízoldékony (Zn)	1.000%
	Cink EDTA (Zn)	1.000%

Leírás

A Greenmaster® Liquid STEP termékben található kelatizált mikroelemek gyors tápanyagfelvételt biztosítanak, így használatával gyorsan korrigálhatók a tápanyaghiányok, tápanyagegyensúly-zavarok. Megakadályozza a tápanyagok lekötődését a talajban.. Egész évben alkalmazható, de a legjobb az intenzív növekedési időszakokban használni. A teljes mikroelemcsomag javítja a gyepek egészségi állapotát és a stressz utáni regenerálódási képességét. Tegye meg a következő lépést a legkorszerűbb tápanyagellátásban a csúcsmínőségű gyepeért!

Előnyök

- \\ Maximális tápanyagbevitelt biztosít, korrigálja a tápanyagegyensúly-zavarokat
- \\ Megakadályozza a tápanyagok lekötődését talajban
- \\ Javítja a gyepek általános egészségi állapotát és a stressz utáni regenerálódását

Használati útmutató

- 1 A lombon keresztüli tápanyagfelvétel optimalizálása érdekében kerülje a magas hőmérsékleten és napsütéses időben történő kijuttatást. Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 2 A Greenmaster® Liquid termékek a termékcsaládon belüli más termékekkel (a Ca-Booster kivételével) egy permetlé tartályban keverhetők. Egy tartályban keverhető a H2Pro és H2Pro Maximize talajnedvesítő szerekkel is. A permetlé elsodródásának minimalizálása és a permetlé minőségének javítása érdekében használja a TurfMark® Extra szórás képjelző adalékot. A Greenmaster® Liquid termékek kijuttatásához használt vízmennyiség befolyásolja a növények tápanyagfelvételének módját.
- 3 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:

20-60 l/ha

Javasolt átlagos dózis:

40 l/ha

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.