



Greenmaster® Pro-Lite®

NK

Professzionális megoldás, ha a gypnek extra káliumra van szüksége a megfelelő növekedéshez

12 | 0 | 12 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	12%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	4.1%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	7.9%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	0%
K ₂ O	Kálium-oxid	12%
	Vízoldékony (K ₂ O)	12.0%
MgO	Magnézium-oxid	3.0%
Fe	Vas	2.00%

Leírás

Káliumban szegény talajviszonyok esetében tavasztól nyár végéig a Greenmaster® Pro-Lite NK a megfelelő választás a gyp tápanyagpótlására. Magas nitrogéntartalma serkenti a hajtásnövekedést és a gyp regenerálódását a nagy igénybevételű időszakokban. A nagyadagú káliumnak köszönhetően a gyp tömörebbé válik, így jól tűri az időjárás és az igénybevétel okozta stresszhatásokat. Foszformentes összetétel, ami megakadályozza a talajban a foszfor felhalmozódását. A hozzáadott vas és magnéziumtar segít a növekedésben és kiváló színt ad a lazább szerkezetű talajokon is.

Előnyök

- \\ Ideális a káliumban szegény talajokon, tavasztól nyár végéig
- \\ Magas nitrogéntartalom az intenzív hajtásnövekedésért és extra kálium a stresszhatások ellen
- \\ A vas- és magnéziumtartalom lendületet ad a növekedésnek és gondoskodik a szép színről a laza talajokon is

Használati útmutató

- 1 Áprilistól szeptemberig alkalmazható
- 2 Száraz gyepfelületre juttassa ki, és csapadékhiány esetén 1-2 nap múlva öntözze be a területet.
- 3 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra, rövidre nyírt felületek esetében csökkenti annak a kockázatát, hogy a fűnyíró felszedi a szemcséket.
- 4 Kerülje az alkalmazást fagyos vagy aszályos időben.
- 5 A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt. Műtrágyázás után 3 napig semmilyen technikával ne végezzen gypszellőztetést.
- 6 Ne használja, ha fennáll a betonnal, márvánnyal, kővel, szövettel stb. való érintkezés veszélye.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt arány:

30-35 g/m²

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.