Agroleaf® Special

Zn

Szüntesse meg a cinkhiányt ezzel a vízoldható műtrágyával

0 | 0 | 0 | TE

N P2O5 K2O

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	0%
Zn	Cink	14.000%
	Vízoldékony (Zn)	14.000%
	Cink EDTA (Zn)	14.000%

Jellemzők

Leírás

Az Agroleaf® Special Zn egy prémium minőségű lombtrágya, amely megelőzi és kordában tartja a cinkhiányt. Növénykultúrák széles körében alkalmazható, például gabonaféléken, zöldségeken, virágokon és gyümölcsfákon. Ráadásul teljesen vízoldékony, így népszerű választás a mezőgazdaságban és a kertészetben. Egy X_3 Active néven ismert speciális aminosavat tartalmaz, amely segít a növénynek a Special Zn gyors megkötésében. Ez mindössze két napon belül csökkenti a cinkhiány okozta fiziológiai stresszt. Az oldat elkészítése egyszerű, és pillanatok alatt teljesen feloldódik. Kizárólag a legkiválóbb alapanyagokat és a legújabb technológiákat használjuk az Agroleaf® Special Zn előállításakor, amely a maga nemében a legmagasabb hatóanyag-koncentrációval rendelkezik. A Special Zn számos egyéb műtrágyával és növényvédő szerrel keverhető, így időt és energiát takaríthat meg a területek művelésekor.

Előnyök

- Megszünteti a cinkhiányt
- Gyorsan és hatékonyan felszívódik a stressz leküzdése céljából
- Fokozza a növény anyagcseréjét

Használati útmutató

1. A permetezésre a késő délutáni vagy esti időszak a legalkalmasabb. Ne alkalmazza olyan kedvezőtlen körülmények esetén, mint az alacsony relatív páratartalom, a magas hőmérséklet, a növények vízhiányos állapota, vagy ha 3 napon belül csapadék várható. Ha a permetezést követő 4 órán belül csapadék esik, 3-4 nap múlva ismételje meg a kezelést.

2. Végezzen kisparcellás próbapermetezést a készítménnyel a javasolt legmagasabb koncentrációban többféle növény esetében egy héttel a tervezett kezelés előtt. Néhány nappal később ellenőrizze az eredményeket.

3. Ugyanígy járjon el, ha más anyagokkal kombinációban kívánja kijuttatni a terméket.

4. A kijuttatáshoz finom cseppképzésű fúvókákkal ellátott magasnyomású permetezőt használjon.

5. Töltse fel a permetezőtartályt a feléig, majd indítsa el a keverési mechanizmust. Öntse be az Agroleaf® Special Zn teljes felhasználni kívánt mennyiségét a tartályba, és várja meg, amíg teljesen feloldódik. Ezután töltse be a gombaölő és/vagy rovarirtó teljes felhasználni kívánt mennyiségét is. Győződjön meg arról, hogy a pH 4 és 6,5 között van; ha szükséges, korrigáljon egy nagyon kis mennyiségű Nova® PeKacid hozzáadásával.

6. Töltse fel a permetezőtartályt annak teljes kapacitásáig. Azonnal kezdje el a permetezést, és ne hagyja abba, amíg a tartály ki nem ürül. Ne tárolja az előző nap bekevert permetlevet.

7. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Az átlagos javasolt koncentráció 0,2-0,3% minden növény esetén

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.