



Nova

Quick-Mg

Quick-Mg, gyors reagálás

0 | 0 | 15 | 13.0
N P2O5 K2O MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	15%
	Vízoldékony (K2O)	15.0%
MgO	Magnézium-oxid	13.0%
	Vízoldékony (MgO)	13.0%

Jellemzők

Leírás

A Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO az ICL egyedülálló kálium- és magnézium formulája: tökéletes kifejezetten kálium- és magnéziumigényes növények számára, mint például a cukorrépa és a burgonya. A hatás azonnal szemmel látható: a Quick-Mg gyorsan felszívódó formájának és magas magnéziumtartalmának köszönhetően a növény pillanatok alatt kizöldül. Mindez a nagy tisztaságú hatóanyagoknak és az alacsony nátriumtartalomnak köszönhető. Ideális tápoldatozáshoz, maximális oldékonysága vízben 680 g/l (20 °C-on).

Előnyök

- \\ Hatékony magnézium- és káliumforrás
- \\ Gyors felvétel, gyors növényi reakció
- \\ Könnyen oldódik

Használati útmutató

- 1 A legtöbb más műtrágyával (nitrogén, kálium, kalcium és bizonyos esetekben foszfor) keverhető, így a Nova Quick-Mg a legtöbb növény tápanyag-utánpótlási programjának egyik alpműtrágyája lehet.
- 2 Kifejezetten javasoljuk például a Nova Ferti-K termékkel egyidejűleg alkalmazni, 1:1,2 Nova Quick-Mg:Nova Ferti-K tömegszázalékos arányban.
- 3 Ez a keverék előnyös, 6,7:1 w/w K+:Mg+2 arányának köszönhetően a növényi sejtekben ezen kationok ideális arányban lesznek. A kálium lényegesen magasabb részaránya jelentősen csökkentheti a gyökerek magnéziumfelvételét.
- 4 A Nova Quick-Mg alkalmazása a következő növények esetében kifejezetten javasolt: lucerna, lóhere, aprómagvú gabonafélék, kukorica, gyapot, cukornád, répa, cukorrépa, takarmányok, brokkoli, káposzta, karfiol, zeller, uborka, tojásgyümölcs, paprika, burgonya, sütőtök, spenót, tök, paradicsom, görögdinnye, áfonya, túlevelű örökzöldek.
- 5 Körülmények, amelyek fennállása esetén a Nova Quick-Mg használata nagy körültekintést igényel, vagy mellőzni kell: sós környezet, az öntözővíz vagy talajoldat magas ECje. A magas sótartalomra és/vagy klórra érzékeny növények, például szamóca, hagyma, sárgarépa, édeskömény, retek, saláta, számos virágfajta, dohány, szőlő.
- 6 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

A törzsoldat javasolt hígítási aránya: 10-15 kg / 100 l víz

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.