



Solinure[®] GT

7

Segítsen növényeinek az indulásban

18 | 11 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

7

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	18%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	3.3%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	11.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	3.4%
P2O5	Foszfor-pentoxid	11%
	Vízoldékony (P2O5)	11.0%
K2O	Kálium-oxid	11%
	Vízoldékony (K2O)	11.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Jellemzők

Leírás

Biztosítsa üvegházban és fóliasátorban termesztett növényei számára a megfelelő tápanyagellátást a korszerű Solinure GT 7 vízoldható műtrágyával. Ezt a magas nitrogéntartalmú NPK formulát kifejezetten üvegházban és fóliasátorban termesztett növényekhez tervezték, különösen a vegetatív növekedési szakaszban történő alkalmazásra. A minimális karbamidtartalomnak és kloridmentes kivitelnek köszönhetően növényei élvezhetik a kelatizált mikroelemek teljes körének előnyeit, valamint a hozzáadott magnéziumot, melyek az egészséges növekedést segítik.

Előnyök

- \\ Ideális üvegházi és fóliás termesztésre
- \\ A növények vegetatív növekedési szakaszára tervezték
- \\ Rendkívül megbízható termék

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 7-et a növekedés vegetatív szakaszában.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák

Adagolás

Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:

40-60 kg/ha hetente

Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:

30-50 kg/ha hetente

Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.