



Solinure® GT

2

Viruljanak növényei minden életszakaszban és évszakban

7 | 19 | 38 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

2

Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	7%
	Nitrát nitrogén (N-NO3)	7.0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	19%
	Vízoldékony (P2O5)	19.0%
K2O	Kálium-oxid	38%
	Vízoldékony (K2O)	38.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.0%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	Vízoldékony (B)	0.01%
Cu	Réz	0.002%
	Vízoldékony (Cu)	0.002%
	Réz EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Vas	0.04%
	Vízoldékony (Fe)	0.04%
	Vas EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Mangán	0.01%
	Vízoldékony (Mn)	0.01%
	Mangán EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdén	0.002%
	Vízoldékony (Mo)	0.002%
Zn	Cink	0.002%
	Vízoldékony (Zn)	0.002%
	Cink EDTA (Zn)	0.002%

Jellemzők

Leírás

A Solinure® GT 2 egy magas kálium- és alacsony nitrogéntartalmú vízoldható NPK műtrágya. Ideális választás üvegházban vagy fóliasátorban termesztett gyümölcs- és zöldségfélék tápanyagpótlására, nemcsak a termés növekedésének és érésének időszakában, hanem a hűvös, fényszegény téli hónapokban is. Nem tartalmaz kloridokat és karbamidot, hozzáadott magnézium-, illetve teljeskörű kelatizált mikroelem-tartalma támogatja a növények fejlődését a kedvezőtlen időszakokban.

Előnyök

- \\ Ideális a termés növekedési és érési szakaszaiban
- \\ Üvegházi és fóliasátras termesztésre kifejlesztett termék
- \\ Hozzáadott magnéziumot és mikroelemeket tartalmaz

Használati útmutató

- 1 Használja a Solinure® GT 2-t a gyümölcs növekedési és érési szakaszaiban, valamint téli termesztés során.
- 2 Tárolja száraz körülmények között.
- 3 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.
- 4 Konkrét, személyre szabott javaslatokért, kérjük, forduljon szaktanácsadójához.

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Adagolás
Szabadföldi és növényházi növények és zöldségek:	40-60 kg/ha hetente
Bogyós és más gyümölcsök, csonthéjasok:	30-50 kg/ha hetente

Javasolt dózis: heti 40-50 kg/ha A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.