



Micromax®

Fe

Gyors megoldás a vashiány leküzdésére

O | O | O | TE

N P2O5 K2O



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	0%
P2O5	Foszfor-pentoxid	0%
K2O	Kálium-oxid	0%
Fe	Vas	7.0%
	Vízoldékony (Fe)	7.0%
	Vas-EDDHA (Fe)	7.0%

Jellemzők

Leírás

Vashiány esetén válassza a Micromax® WS Fe mikroelem-műtrágyát, hogy növényei néhány napon belül visszanyerjék tökéletes egészségüket. Ez a prémium minőségű, tökéletesen vízoldható műtrágya könnyen bekeverhető és kijuttatható. EDDHA-kelát vasat és X3-at, egy specifikus biostimulátort is tartalmaz, amely segít a növényeknek a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban felszívni a tápanyagot a leveleken keresztül. Sokféle növényhez használható, tankkeverékekben is kiválóan alkalmazható.

Előnyök

- \\ Gyorsan megszünteti a vashiányt
- \\ 100%-ban vízoldható: gyorsan és egyszerűen elkészíthető
- \\ Biostimulátor a gyors felszívódásért

Használati útmutató

- 1 A Micromax® elszíneződést okozhat a növényen.
- 2 Tárolja a terméket hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
- 3 Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon szaktanácsadóhoz.

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis

Virágok és zöldségek Tápoldatozás: 3-5 kg/ha, a vasklorózis első tüneteinek megjelenésétől.

Lombtrágyázás: 0,2-0,3%, a vasklorózis első tüneteinek megjelenésétől; majd további két kijuttatás szükséges 10-15 napos időközönként

Fán termő és bogyós
gyümölcsök

Tápoldatozás: 5-7 kg/ha, a vasklorózis első tüneteinek megjelenésétől.

Lombtrágyázás: 0,2-0,3%, a terméskötéstől kezdve; figyelje a vashiányos tüneteket, és szükség esetén azonnal végezzen további 2-3 kezelést 10-15 napos időközönként

Szántóföldi növények

Lombtrágyázás: 0,3-0,4%, a vasklorózis első tüneteinek megjelenésétől; majd további két kijuttatás szükséges 10-15 napos időközönként.

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis területen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.