



Osmoform®

Pre-Mix

Garantisci alle piante un immediato effetto starter e rinverdimento veloce

18 | 9 | 13 | 2 | Micro
N P₂O₅ K₂O MgO



Composizione

Forma
ossidata

N	Azoto Totale	18%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	2.1%
	Azoto ureico (N-Urea)	1.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	14.1%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	9%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	8%
K ₂ O	Ossido di Potassio	13%
	Idrosolubile (K ₂ O)	13%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
B	Boro	0.030%
Cu	Rame	0.10%
	Rame EDTA (Cu)	0.10%
Fe	Ferro	0.10%
	Ferro EDTA (Fe)	0.10%
Mn	Manganese	0.100%
Mo	Molibdeno	0.010%
Zn	Zinco	0.020%

Descrizione

Assicura alle piante un effetto starter immediato e un rapido rinverdimento con questo concime granulare a lenta cessione, da usare sia come concime di base sia di copertura. Messo a punto specificamente per i produttori di substrati, è adatto come concime di base per colture a ciclo breve. Se utilizzato come concime di copertura, in caso di ribaltamento del vaso, non c'è rischio di dispersione del prodotto perché rimane aderente alla superficie del substrato. NB: Negli Osmoform sono presenti delle catene di metilurea di diversa lunghezza che si scompongono lentamente, influenzate da temperatura, attività microbiologica e umidità. Miscelando catene con diverse caratteristiche (lunghezze) abbiamo creato concimi a lenta cessione con qualità e campi di applicazione differenti. L'azoto è rilasciato gradualmente attraverso la scomposizione delle catene di metil-urea e si rende disponibile nell'arco di 8-10 settimane.

Vantaggi

- \\ Miscela con effetto starter contenente azoto a lenta cessione pensato per applicazioni nel substrato, per un rapido rinverdimento
- \\ Formulazione bilanciata di azoto, fosforo, potassio, magnesio e microelementi
- \\ Eccellente rapporto qualità/prezzo
- \\ Dimensioni dei granuli ideali per una dispersione ottimale nel substrato

Modalità d'uso

- 1 Usare Osmoform® Pre-Mix come concimamazioen di base. Dopo l'applicazione, l'azoto agisce per un periodo di circa 8-10 settimane
- 2 Osmoform® Pre-Mix contiene granuli da 0,5 a 1,4 e risulta facile da miscelare nel substrato
- 3 Conservare in luogo asciutto
- 4 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 5 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Dosaggi

	Dose bassa	Dose alta
Piante in contenitore	1-1,5 g/l	1,5-2 g/l

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.