



Player Gr

Fungicida sistemico granulare pronto all'uso, preventivo, curativo ed eradicante

Descrizione

Player® GR è un fungicida sistemico granulare pronto all'uso per tappeti erbosi dall'azione preventiva, curativa ed eradicante.

All'azione di controllo verso i patogeni del Tebuconazolo si unisce l'azione benefica verso la pianta del fosfito di potassio, di cui è ricco il granulo. Il fosfito di potassio nel terreno viene assorbito dalle radici e traslocato all'interno della pianta dove aiuta a costruire le barriere naturali della cellula verso le malattie.

È per questo che un uso regolare di Player® GR in via preventiva rende le infezioni più deboli e circoscrivibili. Un impiego costante del prodotto ha fatto osservare interessanti azioni collaterali nei confronti di Pythium e Cerchi della Strega.

Formulato pronto all'uso, può essere applicato con i normali carrelli e distribuito in concomitanza alle concimazioni.

Vantaggi

- \\ Controlla le malattie fungine più pericolose
- \\ Ampio spettro d'azione
- \\ Azione preventiva, curativa ed eradicante
- \\ Aiuta le difese naturali della pianta: il fosfito di potassio stimola le fitoalessine
- \\ Granuli pronti all'uso

Caratteristiche

Composizione	Tebuconazolo g 0,7 (7 g/kg)
Registrazione n°	13255 del 16/03/2009
Formulazione	Granulare, esente da polveri
Marchio Registrato	Nufarm Italia srl
Imballo	Sacco alluminato 7 kg
Copertura sacco	1000-1300 m ²

Modalità d'uso

Usare Player® GR tra primavera e autunno, meglio se in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi. Se necessario, ripetere il trattamento a distanza di 15-20 giorni. Applicare su tappeto erboso asciutto e irrigare dopo il trattamento. Tempo di rientro: 48 ore.

Periodo d'uso raccomandato

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	GUL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Dosaggi

Malattia	Tipo di strategia	Intervallo trattamenti	Epoca di impiego	Suggerimenti
Rhizoctonia spp, Sclerotinia homeocarpa	Preventiva (5,5kg/1000m ²)	Ogni 15-20 gg	Tarda primavera - estate	Per prevenire efficacemente gli attacchi, iniziare i trattamenti a fine maggio-pri mi giugno per un totale di 3-5 interventi
Rhizoctonia spp, Sclerotinia homeocarpa	Curativa (7kg/1000m ²)	Ogni 15 gg	Tarda primavera - estate	Iniziare le applicazioni al comparire dei primi sintomi della malattia e proseguire a cadenze regolari sino al blocco della diffusione
Microdochium nivale	Preventiva (5,5kg/1000m ²)	Ogni 15 gg	Fine inverno - inizio primavera	Per prevenire efficacemente gli attacchi di Marciume Rosa Invernale iniziare i trattamenti in corrispondenza dello scioglimento della neve e proseguire per un totale di 2-3 interventi
Rhizoctonia spp	Preventiva (5,5kg/1000m ²)	Ogni 15-20 gg	Autunno/inverno - inizio primavera (solo	Iniziare le applicazioni quando le temperature si assestano tra 15-24° C e 35% umidità (pellicola d'acqua sulle foglie

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.