



Dicotex

Erbicida dicotiledonica di postemergenza per aree inerbite di graminacee

Descrizione

Dicotex® grazie all'azione sinergica dei quattro principi attivi che lo compongono possiede un ampio spettro d'azione verso le più comuni infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo. La sua azione si esplica essenzialmente per via fogliare e in parte (Dicamba) per via radicale. Dopo l'applicazione le sostanze attive traslocano agli organi verdi e agli apici vegetativi ove provocano il blocco immediato della crescita e il disfacimento dei tessuti.

Vantaggi

- \\ Controlla le più diffuse specie infestanti a foglia larga
- \\ Agisce anche su malerbe molto sviluppate (5-10 cm)
- \\ Selettivo sui tappeti erbosi di nuova costituzione (6 mesi dalla semina)
- \\ Moderna formulazione in soluzione acquosa
- \\ Pronta risposta erbicida

Caratteristiche

Composizione	2,4D puro g 6,69 (70 g/l)
	Dicamba g 1,88 (20 g/l)
	MCPA g 6,59 (70 g/l)
	MCPP-P g 3,95 (72 g/l)
Registrazione n°	12756 del 27/11/2009
Formulazione	Soluzione acquosa
Marchio registrato	Arysta LifeScience (Belgio)
Imballo	Bottiglia 1l e tanica 5l

Modalità d'uso

Il prodotto si applica nei diversi stadi colturali e su tappeti giovani (dopo 6 mesi dalla semina) con le normali attrezzature irroranti. Può essere vantaggiosamente miscelato con ColourPro al fine di evitare possibili sovrapposizioni di prodotti ed è inoltre compatibile con fungicidi liquidi. L'attività del prodotto è esaltata dalle favorevoli condizioni ambientali: temperature stabili attorno a 10° C, vegetazione asciutta e infestanti ai primi stadi di sviluppo e in attiva crescita. Evitare applicazioni in previsione di pioggia entro le 24 ore o in periodi di prolungata siccità. Eventuali risemine possono essere effettuate a distanza di almeno 3 mesi dal trattamento.

Dosaggi

Destinazione d'uso

Dose

Campi da golf, campi sportivi e aree ricreative	5 l/ha in 10hl di acqua (ovvero 50 ml/100m ² in 10l/acqua)
---	---

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.