



Theorem

Erbicida post-emergenza selettivo con triplice modalità d'azione

Descrizione

La triplice modalità d'azione di questo erbicida di post-emergenza sistemico selettivo per tappeti erbosi lo rende molto efficace nel controllo delle infestanti dicotiledoni. Assorbito da foglie e radici, viene traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta. I principi attivi che contiene gli permettono di agire sia come regolatore di crescita di tipo auxinico (fluroxipir e clopiralid) che come inibitore dell'enzima ALS (florasulam). La crescita della pianta è rallentata già dopo poche ore. Il completo effetto finale è visibile nell'arco di qualche settimana.

Vantaggi

- \\ Attivo su tutte le infestanti a foglia larga Triplo principio attivo con 2 diversi modi d'azione = anti resistenza
- \\ Triplo principio attivo con 2 diversi modi d'azione = anti resistenza
- \\ Sistemico e di rapido effetto
- \\ Funziona anche a basse temperature
- \\ Selettivo per il tappeto erboso

Caratteristiche

Composizione	Clopiralid 80 g/l
	Florasulam 2,5 g/l
	Fluroxipir 144 g /l
Registrazione n°	16035 del
	12/06/2014
Formulazione	emulsione concentrata
Marchio registrato	Corteva
Imballo	Bottiglia da 1l

Modalità d'uso

Da marzo ad ottobre su infestanti in attiva crescita Evitare di applicare il prodotto con temperature elevate o in periodi siccitosi Eseguire il trattamento 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso utilizzando 400 litri d'acqua ad ettaro Effettuare il trattamento evitando che la deriva colpisca le ornamentali vicine

Periodo d'uso raccomandato

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	GUL	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Dosaggi

Destinazione d'uso	DoseEpoca di impiego
Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo	2l/ha Da marzo ad ottobre su infestanti in attiva crescita, evitando di applicare il prodotto con temperature elevate o in periodi siccitosi

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.