



Greenex NF



Diserbante graminicida postemergenza specifico per tappeti erbosi

Descrizione

Greenex® NF rappresenta l'evoluzione del tradizionale Greenex. Infatti, grazie ai coformulanti e alla speciale formulazione (emulsione olio/acqua EW), garantisce un **ottimo controllo delle infestanti da seme e rizomatose** con dosaggi inferiori e mantenendo inalterate efficacia e sicurezza.

Oltre ad avere un dosaggio di p.a. Fenoxaprop-P-etile 2,5 volte maggiore rispetto ai vecchi formulati, Greenex® NF contiene anche un antidoto agronomico (Mefenpirdietile), che ne aumenta le caratteristiche di selettività verso le essenze graminacee costituenti il tappeto erboso.

La possibilità di usarlo a dosi inferiori permette di dover movimentare meno pesi e volumi e abbatte del 50% i tempi richiesti per la preparazione della miscela, svuotamento e lavaggio dei contenitori nonchè riduce i costi del loro smaltimento.

Infestanti controllate

Graminacee macroterme primaverili ed estive

Digitaria
Eleusine
Echinochloa
Panicum
Setaria

e

Gramigna da seme (Cynodon dactylon)

Vantaggi

- \\ Elevata efficacia e selettività
- \\ Riduzione del 50% dei tempi di preparazione della miscela
- \\ Riduzione del 60% dei contenitori da smaltire
- \\ + 40% di superficie trattata per singola confezione

Caratteristiche

Composizione	Fenoxaprop-P-etile puro g 6,57 (69 g/l) Mefenpir-dietile (antidoto agronomico) g 1,78 (18,75 g/l)
Registrazione n°	14262 del 25/02/2011
Formulazione	emulsione olio/acqua
Marchio registrato	Gruppo Bayer
Imballo	Bottiglia 500ml

Dosaggi

Destinazione d'uso	Dose*	Nr. applicazioni
Tappeti già insediati (infestanti a nascita scalare o anticipata)	0,6 (60ml x 1000m ²)	2 applicazioni a distanza di almeno 3 settimane
Tappeti già insediati (infestanti a crescita omogenea)	1,2 (120 ml x 1000m ²)	1 applicazione in piena stagione di crescita
Nuovi impianti	0,6 (60ml x 1000m ²)	2 applicazioni a distanza di 60gg.

*dose intesa in litri/ettaro (l/ha) relativa a volumi d'acqua

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Modalità d'uso

Rigenerazioni:

- L'overseeding con miscugli a base di Lolium p., Festuca r. e Festuca a. è possibile subito dopo il trattamento
- Per altre specie, attendere 3 settimane

Tappeto a rotoli:

- Dopo il trattamento attendere almeno 30 gg prima di rimuovere le zolle.
- Le applicazioni su zolle trapiantate sono possibili solo dopo 30 gg dalla messa a dimora
- Attivo su infestanti già emerse con adeguata superficie fogliare e in attiva fase di crescita
- Evitare i trattamenti subito dopo il taglio o su tappeti erbosi sofferenti
- In caso di siccità o stress idrico, irrigare 1/7 giorni prima del trattamento
- Dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare
- Si considerano condizioni ottimali per il trattamento: temperature superiori a 8° C e umidità sopra al 60%
- Non è compatibile con prodotti che contengono 2,4 D o MCPA
- Specie su cui utilizzare Greenex ® NF:
- Adatto per la difesa di tappeti erbosi costituiti da Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua e Zoysia spp.
- Si possono anche trattare tappeti erbosi consolidati (cioè dopo la prima stagione di crescita) contenenti Agrostis palustris, se è tenuta più alta di 5 millimetri
- Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/greenexnf/>
: 12/05/2024