



Osmocote® Bloom

Bloom 2-3M

Lo specialista delle piante da aiuola, bordure e annuali

13 | 7 | 18 | 20.7 |

N

P₂O₅

K₂O

SO₃

Micro

Descrizione

Specificamente messo a punto per piante fioricole coltivate in piccoli contenitori, Osmocote Bloom garantisce il massimo nutrimento durante tutto il ciclo di coltivazione di bordure, annuali, piante da aiuola. È un concime avvolto a cessione controllata di facile miscelazione nel substrato. Ha un ottimo rapporto resa, qualità e costo. In più assicura un'ottima tenuta post-vendita delle piante, fino al consumatore finale.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	13%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	5.2%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	6.9%
	Ureaformaldehide (N-MU)	0.9%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	7%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	5%

K ₂ O	Ossido di Potassio Idrosolubile (K ₂ O)	18% 18%
MgO	Ossido di Magnesio Idrosolubile (MgO)	1.5% 1%
SO ₃	Anidride Solforica	20.7%
B	Boro Idrosolubile (B)	0.018% 0.016%
Cu	Rame Idrosolubile (Cu)	0.052% 0.052%
Fe	Ferro Ferro EDTA (Fe)	0.35% 0.07%
Mn	Manganese	0.05%
Mo	Molibdeno Idrosolubile (Mo)	0.017% 0.012%
Zn	Zinco	0.021%

Vantaggi

-  Rapporto N:P:K di 2:1:3 è ideale per la crescita sana e compatta delle piante da aiuola
-  La nutrizione è scollegata dalla irrigazione
-  A basso impatto ambientale grazie al basso dilavamento dei nutrienti. Conforme alle regole MPS per la dispersione di azoto e fosforo
-  Minor lavoro e minor uso di concime: è sufficiente una sola applicazione

Il basso valore EC nel substrato migliora la crescita. Meno spreco di concime e risultati migliori. Non richiede l'uso di un concime starter

Prolungata qualità post-vendita

Dosaggi

	Dose bassa	Dose media	Dose alta
Piante/Annuali	fino a 1,5 g/l	1,5-2,5 g/l	fino a 3 g/l

Attenzione: le dosi consigliate si riferiscono a substrati non concimati e sono raccomandazioni generali. I risultati ottimali si ottengono quando il substrato è privo di concimazione di base. Tuttavia, se viene utilizzato un concime starter, si ne sconsiglia la dose superiore a 0,5 kg/m³ in abbinamento ai dosaggi di Osmocote Bloom sopra indicati. Questo concime è studiato appositamente per la miscelazione nei substrati e non va usato nel foro di impianto. In circostanze specifiche, può essere necessaria la concimazione aggiuntiva con idrosolubili.

Modalità d'uso

- 1 Da usare per piante a ciclo breve, da 6 settimane a 3 mesi
- 2 Per altri tipi di piante da aiuola, usa Osmocote 5 3-4M oppure Osmocote Exact High K 5-6M
- 3 La temperatura influisce sulla durata di cessione. La cessione nell'arco di 3-4 mesi è determinata a 21°C. Con 16°C: 4-5M e con 26°C: 2-3M
- 4 Conservare in luogo asciutto
- 5 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 6 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-bloom-2-3m/>
: 12/05/2024