



Osmocote[®]
Exact
Standard

Lo.Start 16-18M

 La partenza migliore per le piante a lenta radicazione

15 | 8 | 11 | 2.0 |

N P₂O₅ K₂O MgO

Micro

Descrizione

L'esclusivo schema di cessione di questo concime avvolto di 3^a generazione, prevede che il rilascio degli elementi nutritivi parta lentamente e aumenti. Questo lo rende ideale per la coltivazione di conifere a lenta radicazione o per le colture sensibili alla salinità e assicurare alle giovani piante una fase iniziale e una crescita sane. Perfetto per situazioni in cui serva una partenza lenta, Osmocote Exact Lo.Start 16-18M è indicato anche per le zone produttive caratterizzate da clima caldo. La soluzione nutritiva perfetta per la giusta partenza alle piante a lenta radicazione in quanto assicura la costante disponibilità di tutti gli elementi nutritivi, compresi i microelementi, durante l'intera stagione di coltivazione.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	15%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	6.6%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	8.4%

P ₂ O ₅	Anidride fosforica	8%
-------------------------------	--------------------	----

	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Ossido di Potassio	11%
	Idrosolubile (K ₂ O)	11%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
	Idrosolubile (MgO)	1.3%
B	Boro	0.02%
	Idrosolubile (B)	0.02%
Cu	Rame	0.05%
	Idrosolubile (Cu)	0.031%
Fe	Ferro	0.45%
	Ferro EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Manganese	0.06%
Mo	Molibdeno	0.02%
	Idrosolubile (Mo)	0.014%
Zn	Zinco	0.015%

Vantaggi

- \\ Nutrizione per piante a radicazione lenta che copre almeno tutto l'arco di un anno
- \\ Sicuro: cessione controllata e alto livello di tutti i microelementi essenziali
- \\ Uniformità di produzione: sacco dopo sacco, gli stessi risultati affidabili
- \\ Schema di cessione ad hoc per i fabbisogni delle piante a partenza lenta

Dosaggi

	Dose bassa	Dose media	Dose alta
Piante in contenitore	4-6 g/l	6-8 g/l	8-10 g/l
Piante in vaso	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l

I dosaggi consigliati fanno riferimento a substrati non concimati. Il pH deve essere adeguato in base al fabbisogno della pianta. Queste sono raccomandazioni generali e vanno adattate a situazioni specifiche di coltivazione.

Modalità d'uso

- 1 Su piante giovani sensibili o a lento sviluppo radicale applicare dopo la radicazione
- 2 La temperatura influisce sulla durata di cessione. La cessione nell'arco di 3-4 mesi è determinata a 21°C. Con 16°C = 20-22M, con 26°C = 12-14M
- 3 Conservare in luogo asciutto
- 4 Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
- 5 Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-lo-start-16-18m/>
: 12/05/2024