Osmocote® Exact Mini

Mini 3-4M

Mini granuli, grandi vantaggi: dosaggio facile, preciso e affidabile per piante in piccoli contenitori

15	9	11	2.0
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Micro

Descrizione

Perfetto per applicazioni in vaso e in piccoli contenitori con volumi ridotti di substrato, come ad esempio vaschette e contenitori fino a 20 ml. Osmocote Exact Mini 3-4M ha una durata di cessione fino a 4 mesi ed è indicato per piante a ciclo più breve, ortive, piante da innesto o da taleaggio. È perfetto per vasi con un diametro inferiore a 8 cm (es vassoi). Lo si può miscelare al substrato o applicare in copertura dopo la radicazione delle piante. Nel caso di taleaggio è consigliabile usarlo nella riconcimazione tra radicazione e rinvaso. 100% avvolto, 100% sicuro per le piante. Disponibile in 2 taglie e 2 formati: sacco da 25kg e secchiello da 10kg.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	**15%**
	Azoto nitrico (N-NO_3)	6.4%
	Azoto ammoniacale (N-NH_4)	8.6%

P_2O_5	Anidride fosforica	**9%**
	Idrosolubile (P_2O_5)	6.5%
K_2O	Ossido di Potassio	**11%**
	Idrosolubile (K_2O)	11%
MgO	Ossido di Magnesio	**2%**
	Idrosolubile (MgO)	1.3%
B	Boro	**0.023%**
	Idrosolubile (B)	0.021%
Cu	Rame	**0.071%**
	Idrosolubile (Cu)	0.05%
Fe	Ferro	**0.46%**
	Idrosolubile (Fe)	0.37%
	Ferro EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Manganese	**0.064%**
Mo	Molibdeno	**0.023%**
	Idrosolubile (Mo)	0.023%
Zn	Zinco	**0.027%**
	Idrosolubile (Zn)	0.018%

Vantaggi

- Riduce significativamente la perdita di nutrienti nei vasi di volume ridotto dovuta all'uso di concimi idrosolubili: i nutrienti rimangono nel substrato
- Crescita uniforme della pianta grazie alla ottimale distribuzione dei granuli nel substrato

Ogni granulo contiene tutti i nutrienti necessari alla pianta

Dosaggi

	Dose bassa	Dose media
Piante da aiuola	1,5-2 g/l	40-60 g/m²
Ortive	2-3 g/l	50-70 g/m²
Talee a crescita veloce	1,5-2 g/l	30-50 g/m²
Piante in piccoli vasi	1,5-2,5 g/l	30-50 g/m²
Talee da silvicoltura	1-2 g/l	30-50 g/m²
Seminati in silvicoltura di specie germinanti entro 2 mesi	1-2 g/l	30-50 g/m²
Talee in contenitore	1-2 g/l	30-50 g/m²

I dosaggi consigliati fanno riferimento a substrati non concimati. Il pH deve essere adeguato in base al fabbisogno della pianta. Queste sono raccomandazioni generali e vanno adattate a situazioni specifiche di coltivazione.

Modalità d'uso

1. Su piante giovani sensibili o a lento sviluppo radicale applicare dopo la radicazione per garantirne una crescita sana e regolare
2. La temperatura influisce sulla durata di cessione. La cessione nell'arco di 3-4 mesi è determinata a 21ºC. Con 16ºC = 4-5M, con 26ºC = 2-3M
3. Conservare in luogo asciutto
4. Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente usati o danneggiati
5. Per maggiori informazioni, contattare il servizio di consulenza tecnica

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

https://icl-growingsolutions.com/it-it/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-3-4m/
: 12/05/2024