



## Sierrablen<sup>®</sup> Plus

### Spring starter 3M

Sostiene la ripresa vegetativa e la crescita del tappeto erboso

24 | 5 | 13  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Composizione

Forma  
ossidata

|                               |                                               |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| N                             | Azoto Totale                                  | 24%   |
|                               | Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> )            | 1.9%  |
|                               | Azoto ammoniacale (N-NH <sub>4</sub> )        | 3.0%  |
|                               | Azoto ureico (N-Urea)                         | 18.0% |
|                               | Ureaformaldehyde (N-MU)                       | 1.1%  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Anidride fosforica                            | 5%    |
|                               | Idrosolubile (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 4.5%  |
| K <sub>2</sub> O              | Ossido di Potassio                            | 13%   |
|                               | Idrosolubile (K <sub>2</sub> O)               | 13.0% |

## Descrizione

Concime avvolto a cessione controllata che favorisce la ripresa vegetativa e sostiene la crescita equilibrata del prato grazie alle tecnologie Poly-S e PACE. L'alto contenuto di azoto e potassio garantisce un notevole effetto rinverdente. Adatto per l'avvio della stagione ma anche per concimazioni durante la stagione di piena attività vegetativa.

## Vantaggi

- \\ Perfetto per la ripresa vegetativa e il mantenimento
- \\ Alto in azoto per una risposta rapida e un veloce rinverdimento
- \\ Garantisce una crescita sana e completa all'inizio della stagione
- \\ Attivo anche a basse temperature
- \\ Stimola l'accrescimento radicale per un tappeto fitto e resistente

## Modalità d'uso

- 1 Applicare su tappeto erboso asciutto
- 2 L'irrigazione dopo l'applicazione favorisce la dispersione e stimola la risposta del tappeto erboso
- 3 Si consiglia l'applicazione dopo le operazioni di arieggiatura per evitare di danneggiare i granuli
- 4 Conservare in luogo asciutto. Chiudere sempre bene i sacchi parzialmente aperti o danneggiati
- 5 Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica

## Periodo d'uso raccomandato

| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Dosaggi

---

Dose: 25 - 35 g/m<sup>2</sup>

## Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.