



# Vitalnova®

**Silk**

Rafforza le pareti cellulari, favorendone l'ispessimento

0 | 10 | 19  
N P2O5 K2O



## Composizione

Forma ossidata

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| N    | Azoto Totale        | 0%  |
| P2O5 | Anidride fosforica  | 10% |
|      | Idrosolubile (P2O5) | 10% |
| K2O  | Ossido di Potassio  | 19% |
|      | Idrosolubile (K2O)  | 19% |

## Caratteristiche

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dose                     | 20 l/ha        |
| Imballo                  | Tanica da 10 l |
| Copertura m <sup>2</sup> | 5.000          |

## Descrizione

Vitalnova Silk contiene silicio, che aiuta le piante a rafforzare le pareti cellulari e a utilizzare l'acqua in modo più efficiente. Contiene inoltre molto potassio per garantire una crescita e una colorazione intense. L'uso di Vitalnova Silk in programmi di gestione integrata è molto importante perché avere pareti cellulari più forti significa: maggiore resistenza all'usura, migliore qualità del taglio e minore suscettibilità agli attacchi fungini. Ideale per l'applicazione prima e durante il periodo estivo.

## Vantaggi

- \\ Aumenta sensibilmente la resistenza meccanica delle pareti cellulari
- \\ Migliore resistenza all'usura e qualità del taglio
- \\ Contiene potassio per migliorare la crescita e la colorazione
- \\ Ottimo per programmi di gestione integrata

## Modalità d'uso

- 1 Non miscelare con altri prodotti per la nutrizione
- 2 Conservare in luogo asciutto. Chiudere sempre bene le taniche parzialmente utilizzate
- 3 Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica

## Periodo d'uso raccomandato

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | GUL | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.