



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Autumn

Un tappeto erboso forte e sano dall'autunno alla primavera

6 | 5 | 10 | Micro
N P2O5 K2O



Composizione

Forma
ossidata

N	Azoto Totale	6%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	4.1%
	Azoto ureico (N-Urea)	1.9%
P2O5	Anidride fosforica	5%
	Idrosolubile (P2O5)	3.0%
K2O	Ossido di Potassio	10%
	Idrosolubile (K2O)	10.0%
Fe	Ferro	6.00%

Descrizione

Greenmaster Pro-Lite Autumn è un concime microgranulare a pronto effetto con tecnologia Pro-Lite, ideale per rafforzare il tappeto erboso durante l'autunno. Il basso contenuto di azoto ammoniacale favorisce un'intensa ripresa, senza picchi di crescita, mentre il 6% di ferro agisce sul rinverdimento ed esplica un'azione di imbrunimento del muschio. Il potassio permette di rinforzare le piante, aiutando il tappeto erboso a superare al meglio gli stress invernali. Gli effetti durano fino a 6 settimane.

Vantaggi

- \\ Ideale in autunno o come primo concime granulare all'inizio della ripresa vegetativa
- \\ Il basso contenuto di azoto e l'alto contenuto di potassio contribuiscono a rinforzare il tappeto erboso
- \\ Migliora la salute e l'aspetto del tappeto erboso

Modalità d'uso

- 1 Applicare sul fogliame asciutto da settembre a marzo. Irrigare dopo 1 - 2 giorni in assenza di pioggia, per favorire la dispersione e ridurre al minimo il rischio di asportazione da parte del tosaerba sulle superfici a taglio basso
- 2 Evitare le applicazioni in condizioni di gelo o siccità
- 3 L'irrigazione dopo l'applicazione riduce al minimo la visibilità delle impronte
- 4 Ritardare il verticutting e il grooming per 3 giorni dopo l'applicazione per consentire ai granuli di disperdersi correttamente
- 5 Contiene ferro - Evitare l'uso in aree contenenti muschio. Non applicare in caso di rischio di contatto con cemento, marmo, pietra, tessuto, piscine, ecc. In caso di versamento su queste aree, spazzolare immediatamente, poiché il prodotto può causare decolorazioni
- 6 Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.