



Solinure® GT

GT 7-19-38

Efficacia e convenienza,
anche in inverno

7 | 19 | 38 | 2.0 | Micro
N P₂O₅ K₂O MgO



Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	7%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	7.0%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	19%
	Idrosolubile (P ₂ O ₅)	19.0%
K ₂ O	Ossido di Potassio	38%
	Idrosolubile (K ₂ O)	38.0%
MgO	Ossido di Magnesio	2.0%
	Idrosolubile (MgO)	2.0%
B	Boro	0.01%
	Idrosolubile (B)	0.01%
Cu	Rame	0.002%
	Idrosolubile (Cu)	0.002%
	Rame EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Ferro	0.04%
	Idrosolubile (Fe)	0.04%
	Ferro EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Manganese	0.01%
	Idrosolubile (Mn)	0.01%
	Manganese EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Idrosolubile (Mo)	0.002%
Zn	Zinco	0.002%
	Idrosolubile (Zn)	0.002%
	Zinco EDTA (Zn)	0.002%

Caratteristiche

Descrizione

I prodotti Solinure® GT sono disponibili in diverse formulazioni e sono ideali per le coltivazioni in tunnel e in serra. Sono realizzati a partire da materie prime pure che forniscono alle colture tutto il nutrimento necessario.

In particolare, Solinure® GT 7-19-38+2MgO+TE ha un alto contenuto di K, è arricchito con il magnesio ed altri mesoelementi, per aiutare la pianta nella fase di ingrossamento e maturazione dei frutti. Inoltre, è indicato anche per le colture fuori suolo e agevola le produzioni durante la stagione invernale.

È un prodotto altamente affidabile e che svolge un'azione regolatrice della crescita in colture a ciclo indeterminato. Non contiene cloruri e sodio.

Vantaggi

- \\ Perfetto per le fasi di crescita e maturazione della frutta
- \\ Ideato per l'applicazione in serra e tunnel
- \\ Contiene magnesio aggiunto e microelementi
- \\ Senza cloro e sodio
- \\ Azione regolatrice della crescita in colture a ciclo indeterminato

Modalità d'uso

- 1 Usa Solinure® GT 7-19-38 per le fasi di crescita e maturazione della frutta, anche per la produzione invernale,
- 2 Tenere lontano dall'umidità.
- 3 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
- 4 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Dosaggi

Colture:	kg/ha
Colture orticole e frutticole in pieno campo o in aree protette:	40-60 kg/ha a settimana
Piccoli frutti, arboree e drupacee:	30-50 kg/ha a settimana

Dosaggio raccomandato: Applica 4-5 kg/1000m² a settimana.

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa. Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Attenzione

Eseguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.