



Sportsmaster® WSF

Spring & Summer

Multi-nutriënten en superoplosbaar

28 | 5 | 19 | TE
N P2O5 K2O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	28%
	Nitraatstikstof (NO3-N)	5.6%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	1.0%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	21.4%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	5.0%
K2O	Kaliumoxide	19%
	Wateroplosbaar (K2O)	19.0%
B	Borium	0.02%
	Wateroplosbaar (B)	0.02%
Cu	Koper	0.016%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.016%
	Koper EDTA (Cu)	0.016%
Fe	IJzer	0.13%
	Wateroplosbaar (Fe)	0.13%
	IJzer DTPA (Fe)	0.13%
Mn	Mangaan	0.06%
	Wateroplosbaar (Mn)	0.06%
	Mangaan EDTA (Mn)	0.06%
Mo	Molybdeen	0.010%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.016%
	Wateroplosbaar (Zn)	0.016%
	Zink EDTA (Zn)	0.016%

Beschrijving

Deze wateroplosbare meststof transformeert de grasmat: onze speciale TMax-technologie stimuleert bladeren en wortels om voedingsstoffen beter op te nemen, en door de aanwezige stikstof is snel effect te zien. Een groot aandeel kalium zorgt voor een gelijkmatige groei en sterker gras. Het is de perfecte aanvulling op je belangrijkste korrelmeststofprogramma, of in een tankmix als je op zoek bent naar meer stikstof. Het stikstof komt uit verschillende bronnen (inclusief een substantiële ureumstikstofcomponent). Het bevat ook een reeks sporenelementen voor een gezondere grasmat. Toe te passen van maart t/m augustus. Sportsmaster® WSF producten zijn tankmengbaar met andere producten binnen het assortiment waaronder H2Pro® wetting agents.

Voordelen

- \\ Veel stikstof voor een snel effect en verbeterde opname
- \\ Gezondere, sterkere grasmat met gelijkmatige groei
- \\ Ideaal in een tankmix voor het optimaliseren van stikstofniveaus

Hoe te gebruiken

De watertemperatuur beïnvloedt de oplossnelheid van dit product.

- 1 Vermijd toepassing bij vorst of droogte.
- 2 Meng met Turf Mark® Extra spuitindicator om het spuiten te vergemakkelijken, het water te conditioneren en drift te minimaliseren.
- 3 Om er zeker van te zijn dat dit product volledig oplost, meng door de benodigde hoeveelheid toe te voegen aan een halfvolle spuittank en roer vervolgens 10 - 15 minuten.
- 4 Vul de tank vervolgens volledig met water.
- 5 Bij morsen op bestrating, beton, kleding, enz. onmiddellijk afborstelen omdat het vlekken kan maken.
- 6
- 7 Bevat ijzer: niet gebruiken bij risico op contact met beton, marmer, steen, stof of zwembaden.
- 8 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur



Doseringen

- Gebruik voor bladtoepassingen lage watervolumes (300 – 600 l/ha) en vermijd hoge temperaturen en zonnige omstandigheden om de opname te optimaliseren.
- Gebruik voor toepassingen met wortelopname grote hoeveelheden water (600 – 1000 l/ha) en irrigeer onmiddellijk daarna gedurende minimaal 2 – 3 minuten, om het benodigde watervolume te leveren en het risico op grasbeschadiging te verminderen.

Aanbevolen dosering:

15 – 60 kg/ha

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.

ICL Growing Solutions Benelux