



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Tevreden gewassen, ongeacht de weersomstandigheden

19 | 5 | 20 | 4.0 | 19.5
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	19%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	1.4%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	17.6%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Kaliumoxide	20%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	20.0%
MgO	Magnesiumoxide	4.0%
SO ₃	Zwaveltrioxide	19.5%

Beschrijving

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO₃ 2-3M bevat een gebalanceerde stikstof en kalium verhouding zodat uw groenten en fruit gelijkmatig groeien. Agromaster® 19-5-20+4MgO+19.5SO₃ 2-3M is ideaal voor gewassen in de vollegrond. Deze meststof bevat extra magnesium om hun fotosynthese te stimuleren en zwavel zodat ze stikstof effectiever kunnen opnemen. De 35% gecoate stikstof met onze ultramoderne E-Max-afgiftetechnologie zorgt voor een geleidelijke afgifte gedurende 2 tot 3 maanden, Hiermee is er minder verspilling: uitspoeling van stikstof, vervluchtiging en denitrificatie worden tot een minimum beperkt.

Voordelen

- \\ Gebalanceerde N-K verhouding voor uniforme groei, plus magnesium en zwavel.
- \\ Blend van direct beschikbare voedingsstoffen en technologisch gecontroleerde afgifte

Hoe te gebruiken

- 1 Breedwerpig toepassen of in de rij (5 cm van het plant-/zaaigoed).
- 2 Agromaster® in de grond inwerken tussen 2-5 cm diepte.
- 3 Plaats het product waar van toepassing onder druppelaars.
- 4 Irrigeren na de toepassing verbetert de prestaties van het product.
- 5 Als u WSF gebruikt in het tweede deel van de teeltcyclus, verlaag dan de dosering van Agromaster® dienovereenkomstig.
- 6 Droog bewaren.
- 7 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 8 Als u meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met uw technische ondersteuning.

Doseringen

Test het eerst op kleine schaal voordat u de dosering of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.