



Osmocote[®] N

Osmocote N 5-6M

Volledige gecoate stikstof voor circulaire, veenarme potgronden.

38 | 0 | 5
N P₂O₅ K₂O

5-6

Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	38%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	37.5%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.5%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	0%
K ₂ O	Kaliumoxide	5%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	5.0%

Beschrijving

Volledig gecoate Osmocote N geeft extra stikstof gedurende 5-6 maanden. Doorgemengd door het substraat ben je verzekerd van een langdurige gedoseerde afgifte van stikstof en wordt uitspoeling voorkomen. Het is ideaal om door te mengen in veenarme, circulaire, substraten als buffer voor stikstofbinding.

Voordelen

- \\ Gedurende 5-6 maanden extra stikstofaanbod voor substraten met stikstofbinding en uitspoeling
- \\ Extra stikstofaanbod voor circulaire, veenarme/veenrijke substraten met bijvoorbeeld houtvezel, bark, kokos, compost, etc.
- \\ Verrijkt met 5% kalium vanwege kalium uitspoeling in houtvezelsubstraten
- \\ Langere werking en minder uitspoeling in vergelijking met snel oplosbare en traagwerkende meststoffen
- \\ Ontwikkeld voor gecombineerd gebruik met andere Osmocote types voor een volledig voedingsaanbod

Doseringen

Gewasgroep	T/M 30% veenvervanging	Meer dan 30% veenvervanging
Boomkwekerijgewassen	0.5 g/l	1 g/l
Potplanten en perkgoed	0.5 g/l	1 g/l
Vaste planten	0.5 g/l	1 g/l

Aandachtspunten bij het gebruik van Osmocote N:

- Geadviseerde doseringen zijn een algemene richtlijn

- in gram/L potinhoud.
- Maximale dosering van een startmeststof is 0,5 g/l substraat.
- Pas de dosering aan op basis van de gewenste plantsoorten en omstandigheden voor specifieke situaties (o.a. in kassen of i.v.m. klimaat).
- Plantgatdosering wordt afgeraden.
- Combineren van Osmocote N met andere Osmocote types.
- Osmocote N voor een volledig voedingsaanbod met andere Osmocote types.
- Voor meer informatie of advies op maat neem contact op met een ICL-adviseur. Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.