



ProTurf®

15-5-5+16CaO+2MgO

Voedingsstof voor tees, fairways en sportvelden

15 | 5 | 5 | 16 | 2.0
N P2O5 K2O CaO MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	15%
	Ammoniumstikstof (NH4-N)	1.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	12.0%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	1.8%
P2O5	Fosforpentoxide	5%
	Wateroplosbaar (P2O5)	4.7%
K2O	Kaliumoxide	5%
	Wateroplosbaar (K2O)	5.0%
CaO	Calcium Oxide	16%
	Wateroplosbaar (CaO)	4.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	2.0%

Beschrijving

ProTurf is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij aanvang van het groeiseizoen. Het is ook goed inzetbaar in uw voedingsprogramma. ProTurf 15-5-5+16CaO+2MgO is een innovatieve voedingsstof voor tees, fairways en sportvelden en is geschikt voor gebruik vanaf maart tot en met september. ProTurf bevat magnesium om de gezondheid en de kleur van het gras te versterken. ProTurf is een innovatieve voedingsstof voor tees, fairways en sportvelden. De ideale combinatie van van minerale- en omhulde voeding zorgt dankzij ICL's Poly-S technologie voor gecontroleerde afgifte gedurende 2 tot 3 maanden. DeProTurf bevat Polyhalite, een uniek natuurlijk 4-in-1 mineraal, met een calciumbron die de bodemstructuur verbetert, zonder pH invloed.

Voordelen

- Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen
- ProTurf werkt 2 tot 3 maanden
- Bevalt Polyhalite, een natuurlijke 4-in-1 bodemverbeterende grondstof, met lage footprint
- Bevat calcium en magnesium voor sterk, gezond en groen gras
- Mini korrel dringt snel in de toplaag en zorgt voor een optimale verdeling
- De aanwezige calciumbron verbetert de bodemstructuur, zonder pH invloed

Hoe te gebruiken

- 1 Direct toepassen op droog blad.
- 2 Niet toepassen bij droogte of vorst.
- 3 Na het aanbrengen water geven om de verspreiding te bevorderen en het onmiddellijke effect te versterken.
- 4 Om het risico op voetafdrukken te verminderen, na de toepassing water geven.
- 5 Om beschadiging van de korrels te voorkomen, toepassen na voltooiing van beluchtingsprogramma's, inclusief verticuteren, insnijden en/of holtiming.
- 6 Sluit gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed af.
- 7 Droog bewaren.
- 8 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.

Doseringen

Aanbevolen dosering:

20 - 35 g/m²

Probeer het eerst op kleine schaal voordat u de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.