



Sportsmaster[®] CRF

Renovator

Een hoog stikstof en fosfaatgehalte, ideaal voor doorzaai of nieuwe graszoden

23 | 24 | 5
N P₂O₅ K₂O



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	23%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	0.7%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	6.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	16.1%
P ₂ O ₅	Fosforpentoxide	24%
	Wateroplosbaar (P ₂ O ₅)	22.6%
K ₂ O	Kaliumoxide	5%
	Wateroplosbaar (K ₂ O)	5.0%

Beschrijving

Renovator bestaat uit gecontroleerd vrijkomende stikstof met Poly-S technologie. SportsmasterCRF Renovator heeft een hoog stikstof en fosfaatgehalte. Dit maakt het product ideaal voor toepassing bij doorzaai of nieuwe graszoden. De gecontroleerde vrijgave van voedingsstoffen minimaliseert het risico op verbranding van het jonge gras. Het hoge gehalte fosfaat bevordert een sterke wortelgroei. De gecontroleerd vrijkomende stikstof past bij de behoefte van de plant om te zorgen voor een snelle beworteling en een dichte grasmatt. SportsmasterCRF, een snelle start met landurig effect! SportsmasterCRF is een gecontroleerd vrijkomende meststof. De korrels zijn van normale grootte en zijn een ideale mix van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding. Voor de gecontroleerde afgifte maakt ICL gebruik van de Poly-S en PACE technologieën. SportsmasterCRF reduceert het aantal toedieningen per jaar in vergelijking tot conventionele meststoffen.

Hoe te gebruiken

- 1 Toepassing na beluchttingsprogramma's zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels
- 2 Pas bij voorkeur toe op droog gras
- 3 Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme droogte
- 4 Beregening na toepassen geeft een snellere penetratie van de korrels en startwerking
- 5 Stel verticaal snijden en/of verzorging uit tot 3 dagen na toediening zodat het product zich goed kan verspreiden
- 6 Verwijder meststofkorrels van tegels en verhardingen om verkleuring te voorkomen
- 7 Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze strooier de coating kan beschadigen
- 8 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur

Aanbevolen gebruiksperiode

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Doseringen

20 – 30 g/m²

Aanbevolen dosering:

20 – 35 g/m²

Probeer het eerst op kleine schaal voordat je de dosering of andere variabelen verandert. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.