



Osmocote[®] Pro

Pro 3-4M

Groeien als een professional

19 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO



Gegarandeerde analyse

Oxide		
N	Totaal stikstof	19%
	Nitraatstikstof (NO ₃ -N)	6.3%
	Ammoniumstikstof (NH ₄ -N)	8.2%
	Ureumstikstof (Ureum-N)	4.5%
P2O5	Fosforpentoxide	9%
	Wateroplosbaar (P2O5)	6.8%
K2O	Kaliumoxide	10%
	Wateroplosbaar (K2O)	10.0%
MgO	Magnesiumoxide	2.0%
	Wateroplosbaar (MgO)	1.3%
B	Borium	0.01%
	Wateroplosbaar (B)	0.01%
Cu	Koper	0.037%
	Wateroplosbaar (Cu)	0.023%
Fe	IJzer	0.30%
	IJzer EDTA (Fe)	0.06%
Mn	Mangaan	0.04%
Mo	Molybdeen	0.015%
	Wateroplosbaar (Mo)	0.010%
Zn	Zink	0.011%

Eigenschappen

Korrelgrootte: 2.0-4.5 mm

Beschrijving

Osmocote Pro 3-4M is vooral geschikt voor opplantingen in het voorjaar, voor snelgroeiende gewassen en voor gewassen met een korte teeltduur. De werkingsduur is drie tot vier maanden. De hoge NPK-formule is ontworpen om de all-round ontwikkeling van planten te bevorderen. Osmocote[®] Pro's unieke harscoatingtechnologie zorgt voor een uiterst regelmatig afgiftepatroon.

Voordelen

- \\ Rijk aan sporenelementen
- \\ Veilig, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik
- \\ Goed geprijsd, veilig en gemakkelijk te gebruiken
- \\ Milieuvriendelijk; met een CRF is er minder uitspoeling naar het milieu
- \\ Consistent en uniform; Osmocote geeft dezelfde resultaten keer op keer

Hoe te gebruiken

- 1 Dankzij de unieke ICL-harscoatingtechnologie heeft Osmocote® Pro een zeer regelmatig afgiftepatroon.
- 2 Combineer Osmocote® Pro met onze wateroplosbare meststoffen voor maximaal resultaat.
- 3 Zorg ervoor dat u de aanbevolen hoeveelheden op het volgende tabblad verlaagt, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid wateroplosbare meststof.
- 4 Gebruik Osmocote® Pro 3-4M voor korte gewascycli en het laat in het voorjaar oppotten van snelgroeiende planten.
- 5 De werkingsduur van Osmocote® Pro 3-4M wordt beïnvloed door de temperatuur. De werkingsduur van het product wordt bepaald bij 21°C. 16°C: 4-5 Mnd - 21°C: 3-4 Mnd - 26°C: 2-3 Mnd.
- 6 Zorg ervoor dat je gedeeltelijk gebruikte of beschadigde zakken goed afsluit.
- 7 Droog bewaren.
- 8 Neem voor meer informatie contact op met een ICL adviseur.



Doseringen

Dosering in gram/liter potinhoud	Lage voedingsbehoefte	Gemiddelde voedingsbehoefte	Hoge voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij	1.5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Potplanten	1.0-2 g/l	3-4 g/l	3-4 g/l
Perkplanten en eenjarige planten	1.5-2.5 g/l	2.5-3.5 g/l	3.5-4.5 g/l

Opgelet De aanbevolen hoeveelheden hierboven zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Dit zijn algemene aanbevelingen. Pas aan voor specifieke situaties, zoals gebruik in tunnels of kassen, of specifieke klimaatomstandigheden. Dit product wordt niet aanbevolen voor dibbling en/of herfst/winter oppotten. Neem contact op met een ICL adviseur voor meer gedetailleerd advies. Probeer het eerst op kleine schaal uit voordat je de dosering, toepassing of andere variabelen verandert. Omdat omstandigheden kunnen verschillen en omdat wij geen controle hebben over de toepassing van onze producten, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele negatieve resultaten.

Let op:

Probeer eerst op kleine schaal alvorens dosering, toepassing of andere variabelen te wijzigen. Aangezien omstandigheden kunnen verschillen en de toepassing van onze producten buiten onze controle ligt, kan ICL Growing Solutions niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige resultaten. Neem contact op met je ICL-adviseur voor een persoonlijk advies.